

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

**FULLSTOP %1**

Dökme Çözelti

Ektoparaziter ( İnsektisit – Akarisit )

**BİLEŞİMİ:** FULLSTOP %1 dökme çözeltisi beher ml'de 10 mg flumetrim içeren, kahverengi-kırmızı renkte, berrak-yağlı bir ektoparaziter çözeltidir.

**FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:** FULLSTOP%1 Dökme Çözelti, sentetik piretroidlerden Flumetrim içerir. Sentetik piretroidler, doğal piretrinlere benzer şekilde temas ve mide zehri olarak etkirler, sistemik bir etki oluşturmazlar. Bu gruptan insektisitler lipofilik niteliklidir. Bu nedenle parazit insektlerin lipoid moleküllerce zengin kutikulasından kolayca geçerek etki noktalarına ulaşırlar. Piretroidler genel olarak yağ dokusuna afinite duyarlar. Derinin stratum korneum tabakasındaki hücreler arası bölgedeki yağlı dokularda birikerek tüm deri yüzeyine yayılırlar. Flumetrim etkisini, parazitlerin sinirlerindeki sodyum kanallarının giriş kinetiğini değiştirmek suretiyle gösterir. Flumetrim sodyum kanallarının ya uzun süre açık kalmasını ya da yavaş kapanmasını sağlayarak sinir hücresi içine fazla miktarda sodyum akımına sebebiyet verir ve bu şekilde sinir iletimi bloke edilmiş olur. Bu da parazitin sinir hücresi membranında tekrarlayan boşalma ve ani depolarizasyona sebep olur ve bu da parazitin felcine sebep olur. FULLSTOP Dökme Çözelti, yağlı çözücü niteliğindeki taşıyıcı içerisinde çözdürüldüğünden, deri üzerine uygulandığında derinin stratum korneum ve deri hücreleri arasındaki yağlı intersellüler yüzeyler arasından geçerek vücudun tamamına yayılır. Flumetrim deri üzerine uygulandıktan 4 saat sonra tüm deri yüzeyine dağılır, 1 gün sonra ise ayaklar dahil tüm deri yüzeyinde önemli kene türlerinin eliminasyonu için yeterli konsantrasyona ulaştığı saptanmıştır. Lipofilik karakterde bir bileşik olduğu içinde vücutta en fazla yağ doku, karaciğer ve böbrekte birikir. Deriden çok az miktarda emildiğinden kalıntı değerleri kabul edilen kalıntı limitlerinin çok altında kalmaktadır. Flumetrim'in metabolitleri idrar (%33) ve dışkı ile atılır. **Toksikolojik bilgiler:** Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) sınıflandırmasına göre Flumetrim'in toksisite sınıfı II'dir. Flumetrim 'in akut oral LD50 değeri dişi Wistar farelerde 41 - 3849 mg/kg'dır. Akut dermal LD50 değeri raflarda >5000 mg/kg c.a. olarak bildirilmiştir.

**ENDİKASYONLAR:** FULLSTOP %1 Dökme Çözeltisi, sığır ve koyunlarda bulunan tek ve çok konaklı kenelere (Boophilus spp., Hyalomma spp., Rhipicephalus spp., Amblyomma spp. Dermacentor marginatus) uyuz etkenleri (Psoroptes uyuzu), ısırıcı sinek, emici ve sokucu bit (*Haemotopinus sternus*, *Linognathus vituli*, *Bovicola bovis*, *B. ovis*, *Melophagus ovinus*) gibi dış parazitlerden ileri gelen invazyonların sağaltımı ve kontrolü amacıyla kullanılır. İlaç, belirtilen parazit çeşitlerinin hem ergin hem de larval şekilleri üzerinde etkilidir.

**KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:** "Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde"

Sulandırılmadan kullanılmaya özgü bir müstahzardır. Şişenin kapağı açılarak hafifçe sıkılır, böylece çözeltinin üstteki bölmeye dolması sağlanır. Farklı uygulama seçenekleri için ayırım gözetmeksizin farmakolojik dozu bütün hayvanlar için 1 mg/ kg canlı ağırlıktır.

**SİĞİRLARDA:** FULLSTOP %1 dökme çözelti, hayvanın bel kemiği (omurgası) üzerinde omuzdan kuyruk sokumuna kadar dökülerek kullanılır. Sığırlarda bir defada kullanılacak ilaç miktarının 50ml'yi geçmemesi gerekir.

**KOYUNLARDA:** FULLSTOP %1 koyunlarda iki şekilde kullanılır,

a) Yeni kırılmış koyunlar aynen, sığırlarda olduğu gibi omuzdan kuyruk sokumuna kadar belkemiği üzerine akıtılarak kullanılır. Eğer hayvanların yapağı veya kılları uzunsu bu takdirde sırt üzerindeki yapağı veya kıl, elle iki yana açılarak, çizgi şeklinde açılan deri kısmı üzerine yine akıtılarak kullanılır,

b) Koyunlarda bir başka kullanma şekli de şöyledir: Hayvan kalçası üzerine oturtularak, karnın yanlarındaki ve ön, arka bacaklar arasındaki yapağısız ya da kılsız çıplak kısımlara, mümkün olduğu kadar çok noktaya ilaç uygulanacak şekilde akıtılarak kullanılır. Yukarıda tarif edildiği şekilde ilacı kullanmak için 5 cc'lik plastik bir şiringa yeterlidir. Şiringanın ucuna iğne takılmayacaktır. İstenilen dozda şiringaya çekilen ilaç yukarıda tarif edildiği gibi hayvana tatbik edilir.

Bir defada uygulanan ilaç, kenelere karşı 4 – 6 hafta süreyle koruyucu etkisini sürdürür. Kene mevsiminin başında ilk olgun kene hayvanın üzerinde görülür görülmez ilaç uygulanırsa etki süresi 6 – 8 hafta sürer. Dış parazit mücadelesinde enfestasyonun çeşidine ve yoğunluğuna göre gerekli görüldüğünde belirtilen sürelerin sonunda aynı dozlarda tekrar uygulanır. Emici ve sokucu bitler ve Psoroptes uyuzu mücadelesinde ise bir defalık ilaç uygulaması kontrol için yeterlidir.

**Pratik doz tablosu**

Sığır		Koyun	
Canlı ağırlık	Doz	Canlı ağırlık	Doz
100 kg canlı ağırlığa kadar	10 ml	10 kg canlı ağırlık	1 ml
100-200 kg canlı ağırlık	20 ml	15 kg canlı ağırlık	1,5 ml
200-300 kg canlı ağırlık	30 ml	20 kg canlı ağırlık	2 ml
300-400 kg canlı ağırlık	40 ml	30 kg canlı ağırlık	3 ml
400 kg'dan fazla sığırlara	50 ml	40 kg canlı ağırlık	4 ml
		50 kg canlı ağırlık	5 ml

*Not: Bit ve uyuz ile mücadele seçeneklerinde belirtilen doz iki katına çıkarılır.*

**ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:** FULLSTOP %1 Dökme Çözeltisi, yalnızca dış parazit enfestasyonlarına karşı sırt ve parazitli bölgelere dökülerek uygulanır. Başka yollardan uygulanmaz. Önerilen sağaltım dozları aşılmamalıdır. Aşırı sıcak havalarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır. Hayvanların göz ve ağız çevreleri ile ağır lezyonlu deri bölgelerine uygulanmamalıdır. Paraziter enfestasyondan korunmak için sürüye yeni girecek hayvanların da ilaçlanması önerilir. Etkili bir eradikasyon için barınak mücadelesi de ihmal edilmemelidir. Uygulama sonrası hayvanların su kaynaklarına girmelerine ve birbirlerini yalamalarına engel olacak tedbirler alınmalıdır. FULLSTOP %1 Dökme çözelti, özel yağlı formülasyonu sayesinde ilaçlamadan sonra hayvanın yağmurla ıslanması nedeniyle insektisit ve akarisit etkinliği ile dışı kenelerin üremelerini engelleyici etkisi azalmaz. Ancak çevre sıcaklığı ve hayvanın vücut kene yükünün az veya çok olması gibi dış etmenlere bağlı olarak kalıcı ve koruyucu etkisi değişebilir, ilaçlanmış hayvanların derisinde 0.5-4 ppm ((g/kg) yoğunlukları arasında bulunan flumetrim varlığında bile, duyarlı kene türlerinde canlı yumurta bırakma olayı % 100'e varan oranlarda engellenebildiğinden, hayvan vücudunda ve yaşam ortamlarında bulunan kene popülasyonları hızla azalır. Çok

Beytullah OKAY

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

22 Eylül 2008

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI  
KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



konakçılı kenelere yönelik ilave uygulamalar: Genç evrelerdeki çok konakçılı keneler kış mevsimlerinde çok aktif oldukları için, izleyen yaz dönemlerinde hayvanları enfeste edebilecek kene yoğunluğunun olanak ölçüsünde azaltılabilmesi için kış döneminde de FULLSTOP % 1 Dökme çözelti ile ilaçlama yapılması önerilir. Gebelikte kullanımına ilişkin bir yan etki bildirilmemiştir

**İSTENMEYEN ETKİLERİ:** Önerilen sağaltım dozlarında uygulandığında herhangi bir yan etki bildirilmemiştir

**İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:** Flumetrim, organik fosforlu insektisitlerle birlikte kullanıldığında mikrozomal enzim sistemine yönelik inhibe edici etkinliği ve nörotoksik etkileri artabilir. Bu durum ilacın memelilere yönelik zehirliliğini artırabilir. İmmun sistemi inhibe etkileri daha belirgin hale gelir.

**GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTI UYARILARI:** İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.) : Sığırlarda et ve süt için ve koyunlarda et için 0 "sıfır" gündür. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanmaz.

**KONTRENDİKASYONLARI:** Etkin maddeye duyarlılığı olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

**GENEL UYARILAR:** Kullanmadan önce Veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Gıda ve yemlerden uzakta bulundurunuz. Ambalajı hasarlı ürünleri almayınız.

**UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR:** Uygulama sırasında uygulayıcıların koruyucu iş elbisesi giyinmeleri ve lastik eldiven kullanmaları gerekir. İlaçlama, iyi havalandırılan ortamlarda veya açık havada yapılmalıdır. Göze ve deriye bulaşma olduğu takdirde hemen bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Uygulama esnasında hiçbir şey yenilip içilmemelidir. Çalışma sonrası bir şey yiyip içmeden önce bulaşık giysiler çıkarılmalı, eller ve deriye bulaşan kısımlar yıkanmalıdır. Zehirlenme durumlarında belirtilere yönelik sağaltım yapılır. Ağızdan alınması durumunda kişi kusturulmaya çalışılmalı ve en kısa sürede bir tabibe başvurulmalıdır. Özel bir antidotu yoktur.

**MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:** Oda ısısının altında (<25 °C), ışıktan koruyarak, kuru ve serin yerde kapağı sıkıca kapatılmış bir halde saklandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 ay (2 yıl)'dir.

**KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR**

İlaç artıkları ve boşalan ilaç kaplarının, derin çukurlara gömülmesi ve başka amaçlarla kullanılmaması gerekir. Bal arıları, balıklar ve diğer su canlıları flumetrimine karşı aşırı derecede duyarlı olduğundan, ilaçlı yıkama suları, ilaç artıkları ve boşalan kaplar, akarsular, göl ve göletlere atılmamalı, arı kovanları ve çevresine uygulanmamalıdır.

**TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:** 100 ml'lik beyaz plastik şişede karton kutu içerisinde; 500 ml, 1L ve 2,5 Litrelik beyaz plastik şişede kutusuz olarak takdim edilmiştir.

**SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:** Eczaneler, veteriner hekim muayenehaneleri ve polikliniklerinde veteriner hekim reçetesi ile satılır.

**PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ:** 22.09.2008

**TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NUMARASI:** 22.09.2008 – 20/051

**RUHSAT SAHİBİNİN ADI/AÇIK ADRESİ:** MEDICAVET TARIM HAYVANCILIK İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Mecidiyeköy İş Merkezi Şehit Ahmet Sok. N:4 K:4D:105 34347 Mecidiyeköy/ İstanbul

**İMAL YERİ ADI/AÇIK ADRESİ:** İLTERİŞ İLAÇ SANAYİ LTD. ŞTİ Reşadiye Yolu No:90 Alemdağ – İstanbul  
0216-4126992

**KDV Dahil Perakende Satış Fiyatı:**

**İmal Tarihi ve Seri No:**

**Son Kullanma Tarihi:**

**İç Ambalaj Etiketli (100 ml)**

**ZEHİRLİ**

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

**FULLSTOP %1**

Dökme Çözelti

Ektoparaziter ( İnektisit – Akarisit )

**BİLEŞİMİ:** FULLSTOP %1 dökme çözeltisi beher ml'de 10 mg flumetrim içeren, kahverengi-kırmızı renkte, berrak-yağlı bir ektoparaziter çözeltidir.

**ENDİKASYONLAR:** FULLSTOP %1 Dökme Çözeltisi, sığır ve koyunlarda bulunan tek ve çok konaklı kenelere (Boophilus spp, Hyalomma spp., Rhipicephalus spp., Amblyomma spp. Dermacentor marginatus) uyuz etkenleri (Psoroptes uyuzu), ısırıcı sinek, emici ve sokucu bit (*Haemotopinus sternus*, *Linognathus vituli*, *Bovicola bovis*, *B. ovis*, *Melophagus ovinus*) gibi dış parazitlerden ileri gelen invazyonların sağaltımı ve kontrolü amacıyla kullanılır. İlaç, belirtilen parazit çeşitlerinin hem ergin hem de larval şekilleri üzerinde etkilidir.

**KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:** "Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde"

Sulandırılmadan kullanılmaya özgü bir müstahzardır. Şişenin kapağı açılarak hafifçe sıkılır, böylece çözeltinin üstteki bölmeye dolması sağlanır. Farklı uygulama seçenekleri için ayırım gözetmeksizin farmakolojik dozu bütün hayvanlar için 1 mg/ kg canlı ağırlıktır.

**SİĞİRLARDA:** FULLSTOP %1 dökme çözelti, hayvanın bel kemiği (omurgası) üzerinde omuzdan kuyruk sokumuna kadar dökülerek kullanılır. Sığırlarda bir defada kullanılacak ilaç miktarının 50ml'yi geçmemesi gerekir.

**KOYUNLARDA:** FULLSTOP %1 koyunlarda iki şekilde kullanılır,

a) Yeni kırılmış koyunlar aynen, sığırlarda olduğu gibi omuzdan kuyruk sokumuna kadar belkemiği üzerine akıtılarak kullanılır. Eğer hayvanların yapağı veya kılları uzunsa bu takdirde sırt üzerindeki yapağı veya kıl, elle iki yana açılarak, çizgi şeklinde açılan deri kısmı üzerine yine akıtılarak kullanılır,

b) Koyunlarda bir başka kullanma şekli de şöyledir: Hayvan kalçası üzerine oturtularak, karnın yanlarındaki ve ön, arka bacaklar arasındaki yapağısız ya da kılsız çıplak kısımlara, mümkün olduğu kadar çok noktaya ilaç uygulanacak şekilde

Beytullah OKAY

Bakan'a

Genel Müdür Yardımcısı

22 EYLÜL 2008

TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI  
KORUMA VE FAYDA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



akıtılarak kullanılır. Yukarıda tarif edildiği şekilde ilacı kullanmak için 5 cc'lik plastik bir şırınga yeterlidir. Şırınganın ucuna iğne takılmayacaktır. İstenilen dozda şırıngaya çekilen ilaç yukarıda tarif edildiği gibi hayvana tatbik edilir.

Ayrıntılı bilgi için prospektüsü okuyunuz.

**GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR :İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.) : Sığırlarda et ve süt için ve koyunlarda et için 0 "sıfır" gündür. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanmaz.**

**GENEL UYARILAR:**Kullanmadan önce Veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Gıda ve yemlerden uzakta bulundurunuz. Ambalajı hasarlı ürünleri almayınız.

**MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:** Oda ısısının altında (<25 °C), ışıktan koruyarak, kuru ve serin yerde kapağı sıkıca kapatılmış bir halde saklandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 ay (2 yıl)'dır.

**TİCARİ AMBALAJ ŞEKLİ:**100 ml'lik beyaz plastik şişede karton kutu içerisinde; 500 ml, 1L ve 2,5 Litrelik beyaz plastik şişede kutusuz olarak takdim edilmiştir.

**SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:**Eczaneler, veteriner hekim muayenahaneleri ve polikliniklerinde veteriner hekim reçetesi ile satılır.

**TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NUMARASI: 22.09.2008 – 20/051**

**RUHSAT SAHİBİNİN ADI/AÇIK ADRESİ:**MEDICAVET Tarım Hayvancılık İlaç Ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. Mecidiyeköy İş Merkezi Şehit Ahmet Sok. N:4 K:4D:105 34347 Mecidiyeköy/ İstanbul

**İMAL YERİ ADI /AÇIK ADRESİ:**İLTERİŞ İlaç Sanayi Ltd. Şti. Reşadiye Yolu No:90 Alemdağ – İstanbul 0216-4126992

**KDV Dahil Perakende Satış Fiyatı:**

**İmal Tarihi ve Seri No:**

**Son Kullanma Tarihi:**

**Dış Ambalaj Etiketli (100 ml)**

**ZEHİRLİ**

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır ✓

**FULLSTOP %1** ✓

Dökme Çözelti ✓

Ektoparaziter ( İnsektisit – Akarisit )

**BİLEŞİMİ:**FULLSTOP %1 dökme çözeltisi beher ml'de 10 mg flumetrin içeren, kahverengi-kırmızı renkte, berrak-yağlı bir ektoparaziter çözeltidir.

✓ **ENDİKASYONLARI:**FULLSTOP %1 Dökme Çözeltisi, sığır ve koyunlarda bulunan tek ve çok konaklı kenelere (Boophilus spp, Hyalomma spp., Rhipicephalus spp., Amblyomma spp. Dermacentor marginatus) uyuz etkenleri (Psoroptes uyuzu), ısırıcı sinek, emici ve sokucu bit (*Haematopinus sternus*, *Linognathus vituli*, *Bovicola bovis*, *B. ovis*, *Melophagus ovinus*) gibi dış parazitlerden ileri gelen invazyonların sağaltımı ve kontrolü amacıyla kullanılır. İlaç, belirtilen parazit çeşitlerinin hem ergin hem de larval şekilleri üzerinde etkilidir.

✓ **KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:**"Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde"

Sulandırılmadan kullanılmaya özgü bir müstahzardır. Şişenin kapağı açılarak hafifçe sıklır, böylece çözeltinin üstteki bölmeye dolması sağlanır. Farklı uygulama seçenekleri için ayırım gözetmeksizin farmakolojik dozu bütün hayvanlar için 1 mg/ kg canlı ağırlıktır.

**SİĞİRLARDA:** FULLSTOP %1 dökme çözelti, hayvanın bel kemiği (omurgası) üzerinde omuzdan kuyruk sokumuna kadar dökülerek kullanılır. Sığırlarda bir defada kullanılacak ilaç miktarının 50ml'yi geçmemesi gerekir.

**KOYUNLARDA:** FULLSTOP %1 koyunlarda iki şekilde kullanılır,

a) Yeni kırılmış koyunlar aynen, sığırlarda olduğu gibi omuzdan kuyruk sokumuna kadar belkemiği üzerine akıtılarak kullanılır. Eğer hayvanların yapağı veya kılları uzunsa bu takdirde sırt üzerindeki yapağı veya kıl, elle iki yana açılarak, çizgi şeklinde açılan deri kısmı üzerine yine akıtılarak kullanılır,

b) Koyunlarda bir başka kullanma şekli de şöyledir: Hayvan kalçası üzerine oturtularak, karnın yanlarındaki ve ön, arka bacaklar arasındaki yapağısız ya da kılsız çıplak kısımlara, mümkün olduğu kadar çok noktaya ilaç uygulanacak şekilde akıtılarak kullanılır. Yukarıda tarif edildiği şekilde ilacı kullanmak için 5 cc'lik plastik bir şırınga yeterlidir. Şırınganın ucuna iğne takılmayacaktır. İstenilen dozda şırıngaya çekilen ilaç yukarıda tarif edildiği gibi hayvana tatbik edilir.

Ayrıntılı bilgi için prospektüsü okuyunuz.

**GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR :İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.) : Sığırlarda et ve süt için ve koyunlarda et için 0 "sıfır" gündür. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanmaz.**

**GENEL UYARILAR:**Kullanmadan önce Veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Gıda ve yemlerden uzakta bulundurunuz. Ambalajı hasarlı ürünleri almayınız.

**MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:** Oda ısısının altında (<25 °C), ışıktan koruyarak, kuru ve serin yerde kapağı sıkıca kapatılmış bir halde saklandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 ay (2 yıl)'dır.

**TİCARİ AMBALAJ ŞEKLİ:**100 ml'lik beyaz plastik şişede karton kutu içerisinde; 500 ml, 1L ve 2,5 Litrelik beyaz plastik şişede kutusuz olarak takdim edilmiştir.

**SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:**Eczaneler, veteriner hekim muayenahaneleri ve polikliniklerinde veteriner hekim reçetesi ile satılır.

**TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NUMARASI: 22.09.2008 – 20/051**

**RUHSAT SAHİBİNİN ADI/AÇIK ADRESİ:**MEDICAVET Tarım Hayvancılık İlaç Ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. Mecidiyeköy İş Merkezi Şehit Ahmet Sok. N:4 K:4D:105 34347 Mecidiyeköy/ İstanbul

**İMAL YERİ ADI /AÇIK ADRESİ:**İLTERİŞ İlaç Sanayi Ltd. Şti. Reşadiye Yolu No:90 Alemdağ - İstanbul 0216-4126992

**KDV Dahil Perakende Satış Fiyatı:**

**İmal Tarihi ve Seri No:**

**Son Kullanma Tarihi:**

Beytullah OKAY

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

22 Eylül 2008

TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI  
KORUM VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.