

Sadece Hayvan Saęlıęında Kullanılır  
**DICLACOX %2,5**  
**Oral Süspansiyon**  
**Veteriner Antikoksidiyal**

**BİLEŐİMİ**

**DICLACOX %2,5 Oral Süspansiyon**, her ml oral çözeltilde 25 mg Diklazuril içeren; açık beyaz, homojen süspansiyondur.

**FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ**

**DICLACOX %2,5 Oral Süspansiyon**, Benzenasetonitril grubundan bir antikoksidiyal ajan olan Diklazuril içermektedir.

Koksidiya etkenlerinin türüne baęlı olarak Diklazuril hem seksüel hem de aseksüel gelişme dönemlerine etkili olduęu görülmüştür. Diklazuril ile yapılan tedavi sonucunda koksidiya yaşam siklusu sekteye uğrar ve uygulamayı takiben 2-3 hafta oosit atılımı görülmez. Bu süre kuzuların maternal antikorların azaldığı dönemi atlattırmasında yardımcı olur. Etki şekli tam olarak bilinmemekle beraber, grubu etken maddeleri gibi hücre solunum zincirinde ve primidin sentezinde görev yapan birtakım enzimleri inhibe ederek Eimeria sp. üzerine etki ettiği düşünölmektedir.

Oral süspansiyon uygulamasında Diklazuril'in emilimi azdır. Plazma pik konsantrasyonuna uygulamadan 24-48 saat sonra ulaşır. Yarılanma ömrü yaklaşık 30 saattir. Diklazurilin metabolizması in vitro olarak koyun hepatositlerinde incelenmiştir. Diclazuril dışkı ile %86-89 oranında deęişmemiş madde olarak atılır.

**KULLANIM YERİ ve ENDİKASYONLARI**

**DICLACOX %2,5 ORAL SÜSPANSİYON Oral Süspansiyon** kuzu ve buzaęıların koksidyoz hastalığından korunması ve tedavisinde etkilidir. Özellikle kuzularda daha patojenik olan Eimeria türlerinin: E. crandalis ve E. ovinoidalis'in tedavisinde endikedir. Buzaęılarda Eimeria bovis ve Eimeria zuernii'ye karşı etkilidir.

**KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU**

*"Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmedięi takdirde."*

Sulandırılarak ięnesiz ölçölü enjektör ile oral yolla uygulanır.

**Tedavi dozu:** Diklazurilin farmakolojik dozu:

**Kuzularda** 1 mg/kg.canlı aęırlıktır. Pratik olarak 1 ml **DICLACOX %2,5 Oral Süspansiyon** 25 kg canlı aęırlığı tedavi eder.

**Buzaęılarda** 5 mg/kg canlı aęırlıktır. Pratik olarak 2 ml **DICLACOX %2,5 Oral Süspansiyon** 10 kg canlı aęırlığı tedavi eder.

**Koruyucu olarak:** 4-6 haftalık yaşıta, Koksidyoz olguları görülme olasılığı yüksek olduğundan 1 doz (Kuzularda 1 ml, buzaęılarda 5 ml **DICLACOX %2,5 Oral Süspansiyon** / 25 kg canlı aęırlık) uygulanır. Gerekirse 3 hafta sonra tekrar edilir.

**İSTENMEYEN ETKİLERİ**

Kuzular ve buzaęılar Diklazuril'i iyi tolere eder. Kuzularda tedavi dozunun 60 katına kadar uygulamalarda herhangi bir yan etki gözlenmemiştir. 7 gün süre ile 5 katı dozda yapılan çalışmalarda da yan etki saptanmamıştır. Buzaęılarda tedavi dozunun 5 katına kadar uygulamalarda herhangi bir yan etki gözlenmemiştir.

**İLAÇ ETKİLEŐİMLERİ**

Bilinen bir ters etkileşim yoktur.

**GİDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI**

**İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Kuzu ve buzaęı eti için kalıntı arınma süresi sıfır (0) gündür.**

## **KONTRENDİKASYONLAR**

Bilinen kontrendikasyonları yoktur.

## **ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLERİ İÇİN ÖZEL UYARILAR**

Kuzular ve buzağular da oral kullanıma uygundur. Saçılımı ve hastalığın epidemiyolojik yayılımını engellemek için sürüdeki bütün hayvanlara aynı anda uygulanmalıdır.

Çok ender durumlarda aşırı duyarlı olan kuzu ve buzağularda, uzun süre ahırda tutulduktan sonra yüksek oranda kontamine olan çayıra çıkartıldıklarında, uygulamadan sonra ağır bir ishal görülebilir. Bu durumda sıvı ve elektrolit tedavisi ve sekonder bakteriyel enfeksiyonların veya miks enfeksiyonların da olabileceği göz önünde bulundurularak antibakteriyel ilaç tedavisi ile desteklenmesi tavsiye olunur.

## **GENEL UYARILAR**

‘Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.’ ‘Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz’

## **MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ**

Orijinal paketinde, oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü iki yıldır.

## **TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ**

20 ml beyaz plastik şişelerde kutulu olarak, 100 ml, 1 Lt, 2.5 Lt ve 5 Lt’lik beyaz plastik şişelerde kutusuz olarak satışa sunulmuştur

## **SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI**

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır. (VHR)

## **PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 07.10.2010**

## **TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI RUHSAT TARİHİ VE NO: 06.10.2010-23/035**

## **RUHSAT SAHİBİNİN ADI/AÇIK ADRESİ**

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San.Ve Tic. Ltd. Şti.  
İTOSB, Eski Asfaltı Üzeri, 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

## **İMAL YERİ ADI/AÇIK ADRESİ:**

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San.Ve Tic. Ltd. Şti.  
İTOSB, Eski Asfaltı Üzeri, 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

**İÇ ETİKET: (20ml şişe)**

**Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır**  
**DICLACOX %2,5**  
**Oral Süspansiyon**  
**Veteriner Antikoksidiyal**

1 ml'de 25 mg Diklazuril içerir.

Kuzu ve buzağuların koksidiyoz hastalığından korunması ve tedavisinde etkilidir.

*Farmakolojik dozu kuzularda* 1 mg/kg canlı ağırlıktır, *Buzağularda* 5 mg/kg canlı ağırlıktır.

**İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Kuzu ve buzağı eti için kalıntı arınma süresi sıfır (0) gündür.**

Raf ömrü 24 aydır.

**İMAL YERİ ADI /AÇIK ADRESİ:** Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San.Ve Tic. Ltd. Şti.

İTOSB, Eski Asfaltı Üzeri, 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

**RUHSAT SAHİBİNİN ADI/AÇIK ADRESİ**

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San.Ve Tic. Ltd. Şti.

İTOSB, Eski Asfaltı Üzeri, 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

**İmal Tarihi ve Seri No:**

**Son Kullanma Tarihi:**

## **DIŐ ETİKET(20ml ŐiŐe)**

Sadece Hayvan Saęlıęında Kullanılır  
**DICLACOX %2,5**  
**Oral Sűspansiyon**  
**Veteriner Antikoksidiyal**

### **BİLEŐİMİ**

**DICLACOX %2,5 Oral Sűspansiyon**, her ml oral ozeltide 25 mg Diklazuril ieren; aık beyaz, homojen sűspansiyondur.

### **KULLANIM YERİ ve ENDİKASYONLARI**

**DICLACOX %2,5 Oral Sűspansiyon** kuzu ve buzaęıların koksidiyoz hastalıęından korunması ve tedavisinde etkilidir. zellikle kuzularda daha patojenik olan Eimeria tűrlerinin: E. crandalis ve E. ovinoidalis'in tedavisinde endikedir. Buzaęılarda Eimeria bovis ve Eimeria zuernii'ye karŐı etkilidir.

### **KULLANIM ŐEKLİ VE DOZU**

***“Veteriner hekim tarafından baŐka Őekilde tavsiye edilmedięi takdirde.”***

Sulandırılarak ięnesiz lűlű enjektűr ile oral yolla uygulanır.

**Tedavi dozu:** Diklazurilin farmakolojik dozu:

**Kuzularda** 1 mg/kg canlı aęırlıktır. Pratik olarak 1 ml **DICLACOX %2,5 Oral Sűspansiyon** 25 kg canlı aęırlıęı tedavi eder.

**Buzaęılarda** 5 mg/kg canlı aęırlıktır. Pratik olarak 2 ml **DICLACOX %2,5 Oral Sűspansiyon** 10 kg canlı aęırlıęı tedavi eder.

**Koruyucu olarak:** 4-6 haftalık yaŐta, koksidiyoz olguları gűrűlme olasılıęı yűksek olduęundan 1 doz (Kuzularda 1 ml, buzaęılarda 5 ml **DICLACOX %2,5 Oral Sűspansiyon** / 25 kg canlı aęırlık) uygulanır. Gerekirse 3 hafta sonra tekrar edilir.

### **GİDALARDA İLA KALINTI UYARILARI**

**İla Kalıntı Arınma Sűresi (i.k.a.s.); Kuzu ve buzaęı eti iin kalıntı arınma sűresi sıfır (0) gűndűr.**

### **GENEL UYARILAR**

‘Kullanmadan nce ve beklenmeyen bir etki gűrűldűęűnde veteriner hekime danıŐınız.’ ‘ocukların ulaŐamayacaęı yerlerde bulundurunuz’

### **MUHAFAZA ŐARTLARI VE RAF MRű**

Orijinal paketinde, oda sıcaklıęında ve ıŐıktan koruyarak saklayınız. Raf mrű iki yıldır.

### **TİCARİ TAKDİM ŐEKLİ**

20 ml beyaz plastik ŐiŐelerde kutulu olarak, 100 ml, 1 Lt, 2.5 Lt ve 5 Lt'lik beyaz plastik ŐiŐelerde kutusuz olarak satıŐa sunulmuŐtur.

### **SATIŐ YERİ VE ŐARTLARI**

Veteriner hekim reetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır. (VHR)

**TARIM VE KŐYİŐLERİ BAKANLIęI RUHSAT TARİHİ VE NO: 06.10.2010-23/035**

### **RUHSAT SAHİBİNİN ADI/AIK ADRESİ**

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İla Ve Kimya San.Ve Tic. Ltd. Őti.

İTOSB, Eski Asfaltı zeri, 12. Cadde No:1 34959, Tepeűren, Tuzla, İSTANBUL/TűRKİYE

### **İMAL YERİ ADI/AIK ADRESİ**

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İla Ve Kimya San.Ve Tic. Ltd. Őti.

İTOSB, Eski Asfaltı zeri, 12. Cadde No:1 34959, Tepeűren, Tuzla, İSTANBUL/TűRKİYE

**KDV Dahil Perakende SatıŐ Fiyatı:**

**İmal Tarihi ve Seri No:**

**Son Kullanma Tarihi:**

**Prospektüs+iç+dış etiket (100ml,1lt,2,5lt,5lt şişe)**

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır  
**DICLACOX%2,5**  
**Oral Süspansiyon**  
**Veteriner Antikoksidiyal**

### **BİLEŞİMİ**

**DICLACOX %2,5 Oral Süspansiyon**, her ml oral çözeltide 25 mg Diklazuril içeren; açık beyaz, homojen süspansiyondur.

### **FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ**

**DICLACOX %2,5 Oral Süspansiyon**, Benzenasetonitril grubundan bir antikoksidiyal ajan olan Diklazuril içermektedir.

Koksidiaya etkenlerinin türüne bağlı olarak Diklazuril hem seksüel hem de aseksüel gelişme dönemlerine etkili olduğu görülmüştür. Diklazuril ile yapılan tedavi sonucunda koksidia yaşam siklusu sekteye uğrar ve uygulamayı takiben 2-3 hafta oosit atılımı görülmez. Bu süre kuzuların maternal antikorların azaldığı dönemi atlattırmasında yardımcı olur. Etki şekli tam olarak bilinmemekle beraber, grubu etken maddeleri gibi hücre solunum zincirinde ve primidin sentezinde görev yapan birtakım enzimleri inhibe ederek Eimeria sp. üzerine etki ettiği düşünülmektedir.

Oral süspansiyon uygulamasında Diklazuril'in emilimi azdır. Plazma pik konsantrasyonuna uygulamadan 24-48 saat sonra ulaşır. Yarılanma ömrü yaklaşık 30 saattir. Diklazurilin metabolizması in vitro olarak koyun hepatositlerinde incelenmiştir. Diklazuril dışkı ile %86-89 oranında değişmemiş madde olarak atılır.

### **KULLANIM YERİ ve ENDİKASYONLARI**

**DICLACOX %2,5 ORAL SÜSPANSİYON Oral Süspansiyon** kuzu ve buzağuların koksidioz hastalığından korunması ve tedavisinde etkilidir. Özellikle kuzularda daha patojenik olan Eimeria türlerinin: E. crandalis ve E. ovinovalis'in tedavisinde endikedir. Buzağularda Eimeria bovis ve Eimeria zuernii'ye karşı etkilidir.

### **KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU**

*“Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde.”*

Sulandırılarak iğnesiz ölçülü enjektör ile oral yolla uygulanır.

**Tedavi dozu:** Diklazurilin farmakolojik dozu:

**Kuzularda** 1 mg/kg.canlı ağırlıktır. Pratik olarak 1 ml **DICLACOX %2,5 Oral Süspansiyon** 25 kg canlı ağırlığı tedavi eder.

**Buzağularda** 5 mg/kg canlı ağırlıktır. Pratik olarak 2 ml **DICLACOX %2,5 Oral Süspansiyon** 10kg canlı ağırlığı tedavi eder.

**Koruyucu olarak:** 4-6 haftalık yaşta, Koksidioz olguları görülme olasılığı yüksek olduğundan 1 doz (Kuzularda 1 ml, buzağularda 5 ml **DICLACOX %2,5 Oral Süspansiyon** / 25 kg canlı ağırlık) uygulanır. Gerekirse 3 hafta sonra tekrar edilir.

### **İSTENMEYEN ETKİLERİ**

Kuzular ve buzağular Diklazuril'i iyi tolere eder. Kuzularda tedavi dozunun 60 katına kadar uygulamalarda herhangi bir yan etki gözlenmemiştir. 7 gün süre ile 5 katı dozda yapılan çalışmalarda da yan etki saptanmamıştır. Buzağularda tedavi dozunun 5 katına kadar uygulamalarda herhangi bir yan etki gözlenmemiştir.

### **İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ**

Bilinen bir ters etkileşim yoktur.

### **GİDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI**

**İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Kuzu ve buzağı eti için kalıntı arınma süresi sıfır (0) gündür.**

## **KONTRENDİKASYONLAR**

Bilinen kontrendikasyonları yoktur.

## **ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLERİ İÇİN ÖZEL UYARILAR**

Kuzular ve buzağular da oral kullanıma uygundur. Saçılımı ve hastalığın epidemiyolojik yayılımını engellemek için sürüdeki bütün hayvanlara aynı anda uygulanmalıdır.

Çok ender durumlarda aşırı duyarlı olan kuzu ve buzağularda, uzun süre ahırda tutulduktan sonra yüksek oranda kontamine olan çayıra çıkartıldıklarında, uygulamadan sonra ağır bir ishal görülebilir. Bu durumda sıvı ve elektrolit tedavisi, ve sekonder bakteriyel enfeksiyonların veya miks enfeksiyonların da olabileceği göz önünde bulundurularak antibakteriyel ilaç tedavisi ile desteklenmesi tavsiye olunur.

## **GENEL UYARILAR**

‘Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.’ ‘Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz’

## **MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ**

Orijinal paketinde, oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü iki yıldır.

## **TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ**

20 ml beyaz plastik şişelerde kutulu olarak, 100 ml, 1 Lt, 2.5 Lt ve 5 Lt'lik beyaz plastik şişelerde kutusuz olarak satışa sunulmuştur

## **SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI**

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır. (VHR)

## **PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 07.10.2010**

## **TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI RUHSAT TARİHİ VE NO: 06.10.2010/23-035**

## **RUHSAT SAHİBİNİN ADI/AÇIK ADRESİ**

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San.Ve Tic. Ltd. Şti.

İTOSB, Eski Asfaltı Üzeri, 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

## **İMAL YERİ ADI/AÇIK ADRESİ:**

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San.Ve Tic. Ltd. Şti.

İTOSB, Eski Asfaltı Üzeri, 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

## **KDV Dahil Perakende Satış Fiyatı:**

## **İmal Tarihi ve Seri No:**

## **Son Kullanma Tarihi:**