

Sadece Hayvan Sağlığında kullanılır.

DANOMED

Oral Çözelti Tozu

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

DANOMED Oral Çözelti Tozu her gr'ında 100 mg Danofloksasine denk miktarda Danofloksasin mesilat içeren beyaz ya da beyazımsı tozudur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Danofloksasin güçlü invitro aktiviteye sahip sentetik bir florokinolondur. Danofloksasinin antimikrobiyal aktivitesi mikrobiyel DNA jiraz enzimlerinin inhibe edilmesine dayanır. İnhibe edici etki enzimatik reaksiyonların ikinci aşamasında gerçekleşir ve DNA'nın ayrılma ve tekrar araya gelme fonksiyonlarını engeller. Danofloksasin diğer florokinolonlarla ortak bir mekanizma ile, DNA ve enzim arasında kalıcı bir kompleks oluşturur. Bunun sonucunda DNA'nın replikasyonu ve transkripsiyonu sona erer.

Başlıca duyarlı bakteriler; *E.coli*, *Salmonella sp.*, *Enterobacter sp.*, *Serratia sp.*, *Proteus sp.*, *Klebsiella sp.*, *Shigella sp.*, *Yersinia sp.*, *Moraxella sp.*, *Acinobacter sp.*, *Actinobacillus sp.*, *Pasteurella sp.*, *Leptospira sp.*, *Campylobacter sp.*, *Citrobacter sp.*, *Haemophilus sp.*, *Ehrlichia sp.*, *Coxiella brunetti*, metisiline ve gentamisine dirençli olanlar da dahil *Staphylococcus sp.*, penisiline dirençli olanlarda dahil *N.gonorrhoeae*, *N. meningitidis*, *Corynebacterium sp.*, *Chlamydia sp.*, *V.cholerae*, *Mycoplasma sp.*'dir.

Strep. suis, *Strep. agalactia*, *Strep. dysgalactia*, *Strep. zooepidemicus*, *R.equi*, *Mycobacterium sp.* orta derecede duyarlılık gösterir. Anaerobik kokların çoğu, *Clostridium sp.*, *Bacteroides sp.*, ve *Ps. maltophila* kinolonlara genellikle az duyarlı veya dirençlidir.

Danofloksasin kanatlılarda oral alımdan 1,5 saat sonra 0,47 µg/ml olan pik serum konsantrasyonuna ulaşır. Yarılma ömrü 6,62 saattir ve biyoyararlanımı %99'dur.

KULLANIM YERİ VE ENDİKASYONLARI

Etlik ve damızlık piliçlerde, *Mycoplasma gallisepticum* ve *Myc. synoviae*'nin neden olduğu kronik solunum yolu hastalığı (CRD)'in tedavisinde;

Myc. gallisepticum'un neden olduğu sinüzitis enfeksiyonunun tedavisinde;

E.coli'nin neden olduğu (*E.coli* solunum hastalığı, sakkulit veya koliseptisemi) veya karıştığı solunum yolu ve sindirim sistemi (Kolibasilloz) enfeksiyonlarının tedavisinde;

Salmonella sp.'nin yol açtığı enterik ve sistemik enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

'Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde'

Farmakolojik doz: Kanatlılarda *E.coli* ve CRD tedavisi için 5 mg/kg canlı ağırlık/gündür.

1 haftalıktan küçük civcivlerde *Mycoplasma* enfeksiyonlarında 50 mg/kg canlı ağırlık/gündür.

Pratik doz: 100 kg canlı ağırlık için 5 gr **DANOMED** içme suyuna ilave edilerek kullanılır.

1 haftalıktan küçük civcivlerde 100 kg canlı ağırlık için 50 gr **DANOMED** kullanılır.

Tedavi süresi 3 gündür.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Florokinolonların fenikoller, rifampin, eritromisin, pılimiksin, antasid, iki ve üç değerli metaller ile birlikte uygulandıklarında antogonistik bir etkileşim gösterdikleri görülmüştür. Fluorokinolon preparatların karaciğer mikrosomal enzim aktivitesini azaltmasına bağlı olarak, theofilin ve kafein gibi preparatların eliminasyon yarı ömrü uzayabilir. Stafilokok, Enterokok ve *Pseudomonas*'a bağlı enfeksiyonların tedavisinde beta-laktam ve aminoglikozid grubu antibiyotikler ile birlikte kullanıldığında sinerjistik etki görülür. Barbiturat ve iyonofor antibiyotiklerle birlikte kullanıldıklarında yan etkilerin oluşması muhtemeldir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra 3 gün geçmeden kanatlılar kesime sevk edilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen kanatlılara uygulanmaz.

KONTRENDİKASYONLAR

Tedavi dozlarında uygulandığında herhangi bir kontrendikasyonu bulunmamakla birlikte karaciğer ve

böbrek fonksiyonlarını bozabilir.

GENEL UYARILAR

‘Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.’

‘Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.’ ‘Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.’ ‘Ambalajı açılmış ürünleri satın almayınız.’

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

İlacın uygulanması esnasında bir şeyler yenip içilmemelidir. Deri ile temas durumunda, vakit geçirmeden su ve sabun ile bölge yıkanmalıdır. Kaza ile göze temas olursa, gözün vakit geçirmeden bol ve temiz suyla yıkanması gereklidir. Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajında 30 C° nin altında saklanmalı ve dondurulmamalıdır. Raf ömrü 24 aydır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

20 gr beyaz şişelerde kutulu olarak, 250 gr, 500 gr, 1 kg ve 2,5 kg’lık beyaz plastik kavanozlarda kutusuz olarak satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle, veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 30.09.2011

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NO: 25.08.2011-24/077

RUHSAT SAHİBİNİN ADI/AÇIK ADRESİ

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İTOSB, Eski Ankara Asfaltı Üzeri, 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

İMAL YERİ:

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İTOSB, Eski Ankara Asfaltı Üzeri, 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

İç Etiket (20 gr için)

Sadece Hayvan Sağlığında kullanılır.

DANOMED

Oral Çözelti Tozu

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

DANOMED Oral Çözelti Tozu her gr’ında 100 mg Danofloksasine denk miktarda Danofloksasin mesilat içeren beyaz ya da beyazımsı tozdur.

RUHSAT SAHİBİNİN ADI/AÇIK ADRESİ

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İTOSB, Eski Ankara Asfaltı Üzeri, 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

İMAL YERİ:

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İTOSB, Eski Ankara Asfaltı Üzeri, 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

GENEL UYARILAR

‘Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.’

‘Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.’ ‘Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.’ ‘Ambalajı açılmış ürünleri satın almayınız.’

KDV Dahil Perakende Satış Fiyatı:

İmal Tarihi ve Seri No:

Son Kullanma Tarihi:

Dış Etiket

Sadece Hayvan Saęlıęında kullanılır.

DANOMED

Oral Çözelti Tozu

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŐİMİ

DANOMED Oral Çözelti Tozu her gr'ında 100 mg Danofloksasine denk miktarda Danofloksasin mesilat içeren beyaz ya da beyazımsı tozdur.

KULLANIM YERİ VE ENDİKASYONLARI

Etlik ve damızlık piliçlerde, *Mycoplasma gallisepticum* ve *Myc. synoviae*'nin neden olduęu kronik solunum yolu hastalığı (CRD)'ın tedavisinde;

Myc. gallisepticum'un neden olduęu sinüzitis enfeksiyonunun tedavisinde;

E.coli'nin neden olduęu (*E.coli* solunum hastalığı, sakkulit veya koliseptisemi) veya karıŐtıęı solunum yolu ve sindirim sistemi (Kolibasilloz) enfeksiyonlarının tedavisinde;

Salmonella sp.'nin yol açtıęı enterik ve sistemik enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

UYGULAMA ŐEKLİ VE DOZU

'Veteriner hekim tarafından başka Őekilde tavsiye edilmedięi takdirde'

Farmakolojik doz: Kanatlılarda E.coli ve CRD tedavisi için 5 mg/kg canlı aęırlık/gündür. 1 haftalıktan küçük civcivlerde Mycoplasma enfeksiyonlarında 50 mg/kg canlı aęırlık/gündür.

Pratik doz: 100 kg canlı aęırlık için 5 gr **DANOMED** içme suyuna ilave edilerek kullanılır. 1 haftalıktan küçük civcivlerde 100 kg canlı aęırlık için 50 gr **DANOMED** kullanılır.

Tedavi süresi 3 gündür.

GİDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra 3 gün geçmeden kanatlılar kesime sevk edilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen kanatlılara uygulanmaz.

GENEL UYARILAR

'Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danıŐınız.'

'Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.' 'Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.' 'Ambalajı açılmıŐ ürünleri satın almayınız.'

MUHAFAZA ŐARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajında 30 °C nin altında saklanmalı ve dondurulmamalıdır. Raf ömrü 24 aydır.

TİCARİ TAKDİM ŐEKLİ

20 gr beyaz Őişelerde kutulu olarak, 250 gr, 500 gr, 1 kg ve 2,5 kg'lık beyaz plastik kavanozlarda kutusuz olarak satıŐa sunulmuŐtur.

SATIŐ YERİ VE ŐARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle, veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIęI RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI:
25.08.2011-24/077

RUHSAT SAHİBİNİN ADI/AÇIK ADRESİ

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San.Ve Tic. Ltd. Őti.

İTOSB, Eski Ankara Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

İMAL YERİ ADI /AÇIK ADRESİ:

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San.Ve Tic. Ltd. Őti.

İTOSB, Eski Ankara Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

KDV Dahil Perakende SatıŐ Fiyatı:

İmal Tarihi ve Seri No:

Son Kullanma Tarihi: