

(Prospektüs+iç/dış ambalaj etiketi )

Sadece Hayvan Saęlıęında Kullanılır  
**POVMED**  
Dezenfektan Çözelti

**BİLEŞİM**

POVMED Dezenfektan Çözelti, kendine özgü iyot kokulu, kahverengi bir çözelti olup her ml'sinde 100 mg povidon-iyot içerir.

**FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER**

**Povmed Dezenfektan Çözeltinin** etken maddesini oluşturan povidon-iyot, iyodun polivinilpirrolidon ile oluşturduęu. suda kolayca çözünebilen kompleks bir bileşiktir. Genel antiseptik ve dezenfektan amaçlarla kullanılabilen povidon-iyodun % 10'luk çözeltisi, % 1 iyot çözeltisine eşdeęer antibakteriyel, antiviral, antifungal, sporisid ve amebiosid etkinlik gösterir. Bu ürünün antiseptik ve dezenfektan etkinlięi, uygulama aşamasında kullanılabilir iyodun serbest bırakılması esasına dayanır. Çok yönlü asepsi, antisepsi ve dezenfeksiyon amaçlarıyla kullanılan povidon-iyot, antibakteriyel spektrumu ve etkinlik bakımından iyot ile eşdeęer özelliklere sahip olmasına karşın, iyodun irkiltici, daęlayıcı, uygulama yerlerini boyayıcı ve zehirleyici gibi istenmeyen ve olumsuz etkilerden tümüyle yoksundur. **Povmed Dezenfektan Çözelti** uygulama çözeltileri halinde hazırlandığında kokusuz, dayanıklı, uygun bir antiseptik etkinlik gösterir. Seyreltik çözeltiler halinde canlı dokulara ve cansız yüzeylere uygulandığında ılımlı boyutlarda ve yavaş yavaş serbest iyot açığa çıkmak suretiyle, uzun süreli antiseptik ve dezenfektan etki meydana getirir.

**KULLANILMA YERLERİ**

*'Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmedięi takdirde'*

**Povmed Dezenfektan Çözelti**, farklı oranlarda sulandırılarak; kümesler ile büyük ve küçük baş hayvan barınakları ile buralarda kullanılan çiftlik malzemelerinin genel dezenfeksiyonu, kuluçkahane ve ekipmanları, taşıt araçları, et ve süt işleme tesisleri, gıda üretilen işletmeler ile içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu ve kötü kokuların giderilmesinde; ayrıca, enjeksiyonlar ve cerrahi müdahaleden önce operasyon bölgesinde asepsi; patojen mikroorganizmalarla bulaşmış lezyonlu deri ve mukozalar ile ayaklar, tırnaklar arası bölge ve meme başında antisepsi sağlanması amaçlarıyla kullanılır. Aynı şekilde rekto-vaginal yoklamalar öncesi muhtemel bir enfeksiyona karşı koruyucu amaçla el ve kollara sürülür.

**KULLANILMA ŞEKLİ VE DOZLARI**

**Dezenfeksiyon uygulamaları :** Povmed Dezenfektan Çözelti, kullanım amacına göre su ile farklı oranlarda sulandırıldıktan sonra aşağıdaki tabloda belirtilen uygulama seçenekleri doğrultusunda dezenfeksiyon amaçlarıyla kullanılır.

Kullanılma Amacı	Sulandırma oranı (Povmed/su)	Kullanım Şekli
Şap, Pododermatitis, Çatal çürüğü	1/125	Ayak banyosu şeklinde uygulanır.
Barınaklar (kümes, ahır, ağıl vb), çiftlik malzemeleri, kuluçkahane ve ekipmanları, taşıt araçları vb., dezenfeksiyonu ile ayak ve tekerlek banyosu	1/150	Yıkama ve sisleme işlemleriyle uygulanır.
Genel amaçlı dezenfeksiyon	1/300	Sisleme
Kellik (Trikofiti)	1/125	Lezyonlu yerlerin bakımı ve bulaşık barınakların yıkanması
Brusella çiçek, kuduz, tetanoz ve Diğer bakteriyel ve viral hastalıklar	1/150	Barınak ve ekipmanların yıkanması, püskürme ve sisleme işlemleri
Newcastle (Yalancı veba), Avian influenza	1/80	Kümes ve ekipmanların yıkanması ve sisleme.
Mycoplasma spp.	1/30	Enfeksiyonun varlığında 6 veya 12 gün arayla, enfeksiyon riskine karşı günde 1 defa sisleme tarzında uygulanır.
Kapalı barınak havasının Dezenfeksiyonu, sisleme.	1/50	Karışımın 1 L'si 1000 m <sup>3</sup> ortam havasını dezenfekte eder.
Memelerin antisepsisi için	1/240	Daldırma sıvısı şeklinde

**Asepsi ve antisepsi uygulamaları:** Sulandırılmaksızın, uygun bir pens veya sivri uçlu tahta parçasına dolanmış pamuk ya da gazlı beze emdirilmek suretiyle, enjeksiyon noktaları, operasyon bölgesi, enfekte lezyonlar ve yaralara uygulanır.

**İSTENMEYEN/YAN ETKİLERİ**

Uzun süre temas edilmesi durumunda dermatitise sebep olabilir. Tiroid bozukluğu olanlarda uzun süreli kullanılmaz.

**İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ**

Sulu çözelti halindeki povidon-iyodun bakterisid etkinlięi uygulandığı ortamda organik maddelerin var olması halinde belirgin derecede azalır. Serbest kalan iyot, ortamdaki diğer organik maddelerle kimyasal tepkimeye girerek antibakteriyel etkinlikten yoksun organik kompleksler oluşturabilir. Bu tür olumsuz etkileşimler özellikle nekrotik dokular, kan, irin.

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIęI  
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜęÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

16 KAS 2007

H. Hüseyin POLAT  
Bakan'a.  
Genel Müdür Yardımcısı

cerahat, hemoglobini, sığır albümini, anyonik ve amfolitik deterjanların varlığında ortaya çıkar. Hayvanlar üzerine harici uygulamalarda dokuda kimyasal bir yanık meydana gelebileceğinden civalı antiseptikler ile beraber kullanılmalıdır. Etkinliğini azaltılabileceğinden dolayı alkalilerle (sabunlar, sodyum loril sülfat ve sodyum ve potasyum oleatlar ... vb) birlikte kullanılmamalıdır

#### **DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDÖT**

Sulu çözelti şeklinde uygulanan povidon-iyot, iyodoforların sulu veya alkollü çözeltilerinin yol açtığı doku irkiltisi, alerjik reaksiyonlar, zehir etkisi, boyayıcı ve dağlayıcı yöndeki istenmeyen etkilerini göstermez. Yoğun kullanımında deri üzerinde oluşabilecek zararlı etkisi, uygulanmasından kısa bir süre sonra silmekle önenebilir. Konsantr ürün kaza ile içirildiğinde oluşabilecek akut zehirlenmelerin sağaltımında nişastalı su veya %10'luk sodyum hiposülfat ile mide yıkanır. sodyum tiyosülfat içirilir.

#### **GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:**

**İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.):Et,süt ve yumurta için '0' gündür.**

#### **KONTRENDİKASYONLAR:**

Geniş ve ileri derecede yanıklar ile böbrek fonksiyonları yetersiz hayvanlarda kullanılmamalıdır. İyot ve povidon-iyot'a duyarlılığı bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

#### **GENEL UYARILAR**

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Mukozaların antiseptisi amacıyla uygulanamaz. Ürün hayvanlara direkt olarak içirilmemelidir.

#### **UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN TEDBİRLER**

Uygulayıcı elemanların uygulama esnasında uygun iş elbiseleri, maske, gözlük ve eldiven kullanmaları gerekir. Göz ve mukozalara bulaştırmaktan ve buharını solumaktan sakınılması gerekir. İyoda duyarlılığı olan kişiler dikkatli kullanılmalıdır. Uygulama aşamalarında hiç bir şeyin yenilip içilmemesi gerekir. Uygulama yapılan yerler yeterince havalandırılmalıdır.

#### **MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ**

Raf ömrü oda sıcaklığında (15 - 24 °C derece) 2 yıldır. **POVMED Dezenfektan Çözelti**, ağzı sıkıca kapatılabilen, ışık geçirmez kaplarda ve güneş ışığından korunarak muhafaza edilir.

#### **TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ**

1000 ml'lik beyaz renkli ve mavi kilit kapaklı plastik şişe ve 5 L, 10 L, 20 L, 25 L ve 50 L'lik bidonlarda.

**SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:** Veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde reçetesiz satılır.

**PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 16.11.2007**

**TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI RUHSAT TARİH-NO : 14.09.04 – 13/089**

#### **RUHSAT SAHİBİNİN ADI / AÇIK ADRESİ:**

**MEDICAVET TARIM ,HAYVANCILIK, İLAÇ VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**  
Mecidiyeköy İşmerkezi  
Şehit Ahmet Sok.No:4 D:105  
34347 Mecidiyeköy /İstanbul


#### **İMAL YERİ ADI / AÇIK ADRESİ:**

DAMLA İLAÇ ve KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  
KEYAP Sitesi E2 Blok No:81 Y.Dudullu  
34775 Ümraniye / İSTANBUL KDV Dahil Perakende Satış Fiyatı

----- TL

Üretim Tarihi/Seri No:

Son Kullanma Tarihi:



16 KAS 2007

