

Sadece Hayvan Saęlıęında Kullanılır
MEDICOL
Oral Çözelti
Barsak Antibakteriyeli

BİLEŞİMİ

MEDICOL açık sarı renkte, berrak çözelti olup, 1 ml'sinde 4.800.000 I.U. kolistin sülfat içerir (1 ml'sinde 240 mg kolistin sülfat'a eşdeęer).

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

MEDICOL Oral Çözeltinin etken maddesini oluşturan kolistin sülfat; *Bacillus colistinus* kültürlerinden elde edilmiş polipeptid yapılı bir antibiyotiktir. Bakterilerin hücre zarında bulunan fosfolipidlerin yapısında önemli ölçüde fonksiyonel bozukluęa yol açarak kuvvetli bakterisidal etkinlik gösterir. Kolistin başlıca (*E.coli*, *Salmonella spp*; *Salmonella typhimurium*, *Salmonella enteritis* gibi, *Pseudomonas aeroginosa* vs.) gram negatif bakterilere etkilidir.

Proteus ve Serratia dirençlidir.

Oral yoldan çözelti halinde uygulandığında sindirim kanalından emilmez.

Oral yolla uygulandığında sindirim sisteminde dağılır ve başlıca dışkı ile atılır.

KULLANIM YERİ VE ENDİKASYONLARI

Tavuk, tavşan, buzaęı ve kuzularda duyarlı gram negatif bakteriler (*E. coli*, *Salmonella spp*; *Salmonella typhimurium*, *Salmonella enteritis* gibi, *Pseudomonas aeroginosa* vs.) tarafından meydana getirilen sindirim sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

"Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmedięi takdirde"

Tavuklarda 100.000 I.U./kg canlı aęırlık/gün dozunda kullanılır. Buna göre toplu uygulamalarda her 100 kg canlı aęırlık için yaklaşık 2 ml **MEDICOL**, günlük içme suyuna katılarak kullanılır, ilaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır.

Buzaęı, kuzu ve tavşanlarda ise 100,000 I.U./kg canlı aęırlık/gün dozunda uygulanır. Buna göre 1 ml **MEDICOL** yaklaşık 50 kg canlı aęırlık için yeterlidir. İçme suyuna katılarak içirilir. Tedavilere tüm türlerde 3-4 gün devam edilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Özellikle doğumdan sonraki ilk 24-48 saat boyunca sindirim sisteminin emme yeteneęinin çok iyi olması nedeniyle, yetişkinlerde son derece sınırlı ölçüde emilen veya emilmeyen bazı maddeler yeni doğanlarda zehirlenmeye yol açabilecek ölçüde emilebilmektedir. Yeni doğanlarda bu husus göz önünde bulundurulmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLERİ

Böbrek ve sinirler üzerine güçlü etkisi olan ilaçtır. Sağlam deri ve mukozalardan emilmezler ancak hasarlı, yangılı kısımlardan emilerek sistemik zehirlenmeye yol açabilirler. Ağızdan kullanımda bulantı, kusma ve sürgüne yol açabilir. Nefrotoksisite riski nedeniyle dört günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Kolistin, kalsiyum kanal blokerleri ve demir preparatları ile kombine uygulamaları halinde nefrotoksik ve nöromusküler blokaj yapıcı etkileri arttırdığından birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Saęaltım amacıyla doğrudan sindirim sistemi yoluyla uygulandığında emilmedięinden zehirli etki riski yaratmaz. Uzun süreli ve aşırı yüksek dozlarda kullanılması durumunda oluşabilecek toksik etkileri gidermek amacıyla öncelikle ilaçla tedavi kesilmeli ve bol sıvı uygulamasıyla atılım sağlanmalıdır.

GİDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen buzaęı, kuzu ve tavuklar 1 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurta için ilaç kalıntı arınma süresi '0' gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Tedavi dozlarında güvenlidir, ilaç böbrek yetmezliği olan ve kolistine karşı hassasiyeti olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

‘Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.’

‘Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.’ ‘Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.’ ‘Ambalajı açılmış ürünleri satın almayınız.’

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN TEDBİRLER VE HEKİMLER İÇİN UYARI

Kolistine duyarlılığı olan kişilerin ağız, deri veya inhalasyon yoluyla ilaca maruz kalmaktan sakınması gerekir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (15°C - 25°C) ve güneş ışığından ve nemden korunarak muhafaza edilir. Ambalajı açılmadan raf ömrü 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

20 ml kutulu olarak, 500 ml, 1 Litre, 2,5 Litre ve 5 Litrelik plastik şişelerde kutusuz olarak satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile, veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 13.07.2009

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NUMARASI: 24.06.2009 - 21/070

RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE AÇIK ADRESİ

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İTOSB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

İMAL YERİ ADI VE AÇIK ADRESİ

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İTOSB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

Dış Ambalaj Etiketi (20 ml için)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
MEDICOL
Oral Çözelti
Barsak Antibakteriyeli

BİLEŞİMİ

MEDICOL açık sarı renkte, berrak çözelti olup, 1 ml'sinde 4.800.000 I.U. kolistin sülfat içerir (1 ml'sinde 240 mg kolistin sülfat'a eşdeğer).

KULLANIM YERİ VE ENDİKASYONLARI

Tavuk, tavşan, buzağı ve kuzularda duyarlı gram negatif bakteriler (*E. coli*, *Salmonella spp*; *Salmonella typhimurium*, *Salmonella enteritis* gibi, *Pseudomonas aeroginosa* vs.) tarafından meydana getirilen sindirim sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

"Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde"

Tavuklarda 100.000 I.U./kg canlı ağırlık/gün dozunda kullanılır. Buna göre toplu uygulamalarda her 100 kg canlı ağırlık için yaklaşık 2 ml **MEDICOL**, günlük içme suyuna katılarak kullanılır, ilaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır.

Buzağı, kuzu ve tavşanlarda ise 100,000 I.U./kg canlı ağırlık/gün dozunda uygulanır. Buna göre 1 ml **MEDICOL** yaklaşık 50 kg canlı ağırlık için yeterlidir. İçme suyuna katılarak içirilir. Tedavilere tüm türlerde 3-4 gün devam edilir.

GİDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen buzağı, kuzu ve tavuklar 1 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurta için ilaç kalıntı arınma süresi '0' gündür.

GENEL UYARILAR

'Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.'

'Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.' 'Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.' 'Ambalajı açılmış ürünleri satın almayınız.'

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (15°C - 25°C) ve güneş ışığından ve nemden korunarak muhafaza edilir. Ambalajı açılmadan raf ömrü 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

20 ml kutulu olarak, 500 ml, 1 Litre, 2,5 Litre ve 5 Litrelik plastik şişelerde kutusuz olarak satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile, veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 13.07.2009

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NUMARASI: 24.06.2009 - 21/070

RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE AÇIK ADRESİ

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San.Ve Tic. Ltd. Şti.

İTOSB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

İMAL YERİ ADI VE AÇIK ADRESİ

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San.Ve Tic. Ltd. Şti.

İTOSB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

Seri No

İmal Tarihi

Son Kullanım Tarihi

Perakende satış fiyatı (KDV Dahil)

İç Ambalaj Etiketi

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
MEDICOL
Oral Çözelti
Barsak Antibakteriyeli

BİLEŞİMİ

MEDICOL açık sarı renkte, berrak çözelti olup, 1 ml'sinde 4.800.000 I.U. kolistin sülfat içerir (1 ml'sinde 240 mg kolistin sülfat'a eşdeğer).

Tavuk, tavşan, buzağı ve kuzularda duyarlı gram negatif bakteriler (E. coli, Salmonella spp; Salmonella typhimurium, Salmonella enteritis gibi, Pseudomonas aeruginosa vs.) tarafından meydana getirilen sindirim sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

"Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde"

Tavuklarda 100.000 I.U./kg canlı ağırlık/gün dozunda kullanılır. Detay için prospektüsü okuyunuz.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen buzağı, kuzu ve tavuklar 1 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurta için ilaç kalıntı arınma süresi '0' gündür.

'Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.'

'Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.' 'Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.' 'Ambalajı açılmış ürünleri satın almayınız.'

Oda sıcaklığında (15°C - 25°C) ve güneş ışığından ve nemden korunarak muhafaza edilir. Ambalajı açılmadan raf ömrü 2 yıldır.

20 ml kutulu olarak, 500 ml, 1 Litre, 2,5 Litre ve 5 Litrelik plastik şişelerde kutusuz olarak satışa sunulmuştur.

Veteriner hekim reçetesi ile, veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır. (VHR)

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NUMARASI: 24.06.2009 - 21/070

RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE AÇIK ADRESİ

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İTOSB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

İMAL YERİ ADI VE AÇIK ADRESİ

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İTOSB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

Seri No

İmal Tarihi

Son Kullanım Tarihi

Perakende satış fiyatı (KDV Dahil)