

Sadece Hayvan Saęlıęında Kullanılır
MEDIQUINOL %10
Oral Çözelti
Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Mediquinol %10 Oral Çözelti berrak açık sarı renkli bir çözelti olup 1 ml'sinde 100 mg Enrofloksasin baz içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Mediquinol %10 Oral Çözelti'nin etkin maddesini oluşturan Enrofloksasin 3. kuşak florokinolon grubu bir antibakteriyeldir. Enrofloksasin, bakteri sitoplazmasında bulunan ve bakterilerin metabolik faaliyetlerinde temel enzimi olan DNA-giraz (topoizomeraz II) enzimini inhibe ederek, DNA sentezi ve replikasyonunu bozmak suretiyle bakterisidal etkinlik gösterir.

Başlıca duyarlı bakteriler: *E.coli*, *Salmonella sp.*, *Enterobacter sp.*, *Serratia sp.*, *Proteus sp.*, *Klebsiella sp.*, *Shigella sp.*, *Yersinia sp.*, *Moraxella sp.*, *Acinobacter sp.*, *Actinobacillus sp.*, *Pasteurella sp.*, *Leptospira sp.*, *Camphylobacter sp.*, *Citrobacter sp.*, *Haemophylus sp.*, *Ehrlichia sp.*, *Coxiella brunetti*, metisiline ve gentamisine dirençli olanlar da dahil *Staphylococcus sp.*, penisiline dirençli olanlar da dahil *N.gonorhoeae*, *N.meningiditis*, *Corynebacterium sp.*, *Chlamydia sp.*, *V.cholerae*, *Mycoplasma sp.*'dir.

Strep. suis, *Strep. agalactia*, *Strep. dysgalactia*, *Strep. zoopidemicus*, *R. equi*, *Mycobacterium sp.* orta derecede duyarlılık gösterir.

Anaerobik kokların çoęu *Clostridium sp.*, *Bacteroides sp.* ve *Ps. maltophila* kinolonlara genellikle az duyarlı veya dirençlidir.

Çözelti halinde hayvanlara ağız yoluyla verildiğinde sindirim kanalından hızla ve %60'dan daha yüksek oranda emilir ve tüm vücut dokuları ile sıvılarına yüksek konsantrasyonlarda ulaşır. Safra, karacięer, akcięer ve böbreklerde yüksek yoğunluklara ulaşır, ancak akcięerdeki yoğunluęu plazmadakinin bir kaç katına çıkabilir. Ortalama 0,5-2 saat içinde doruk plazma yoğunluęuna ulaşır ve etkin yoğunluęunu ortalama 12 saat korur. Enrofloksasin vücutta siprofloksasin dahil birçok etkili, etkisiz metabolite çevrilir. Eliminasyonu büyük oranda böbreklerden ve safradan gerçekleşir.

KULLANIM YERİ VE ENDİKASYONLARI

Mediquinol %10 Oral Çözelti, etçi tavuklarda: CRD, Mycoplasmosis, Colicepticemia, Coryza, Fowl Cholera (tavuk kolerası), Fowl Typhoid (tavuk tifosu), Salmonellosis, Staphylococcus ve Streptococcus enfeksiyonlarında, rumen aktivitesi başlamamış kuzu ve buzaęılarda; Colibacillosis, Pasteurollosis, Salmonellosis, Mycoplasmosis, duyarlı bakteriler tarafından oluşturulan solunum ve üriner sistem enfeksiyonları ile viral hastalıklar sonucu oluşan sekonder bakteriyel enfeksiyonların saęaltımında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

"Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmedięi takdirde."

Mediquinol %10 Oral Çözelti' nin etçi tavuklarda uygulanacak dozu 10 mg/kg canlı aęırlık/gün olup, içme suyuna ilave edilerek kullanılır. **Pratik olarak** her 1000 kg canlı aęırlık için günde 100 ml ilaç yeterlidir. Gerekli ilaç miktarı yeteri kadar su ile karıştırılır ve 3 gün boyunca içirilir. Salmonellosis'te veya şiddetli enfeksiyonlarda 5 güne çıkarılmalıdır. Etkinlik kaybının olmaması açısından ilaçlı suyun günlük olarak hazırlanması gerekir, ilacın karıştırılacağı suyun asit karakter taşımamasına özen gösterilmelidir.

Rumen aktivitesi başlamamış kuzu ve buzaęılarda ise ilaç dozu 2,5 mg/kg canlı aęırlık/gün esası ile 40 kg canlı aęırlığa 1 ml Mediquinol olacak şekilde içme suyuna ilave edilerek 3-5 gün süreyle uygulamaya devam edilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Rumen florasına olumsuz etkilerinden dolayı rumen faaliyetleri başlamış kuzu ve buzaęılarda sistemik tedavi amacıyla kullanılmamalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER:

Siprofloksasin ve enrofloksasin gibi bazı kinolonlar bazen idrar yollarında kristallenmeye yol açabilir. Bu nedenle bu ilaçlar verilirken su kısıtlaması yapılmamalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Florokinolonlar ile aminoglikozidler, beta-laktam ilaçlar ve sülfonamidler arasında aynı yönde (sinerjistik);

eritromisin, polimiksin, nitrofurantoin ve rifampin arasında aksi yönde (antagonist) etkileşimler vardır. Şelat oluşturmaları nedeniyle alüminyum, demir, magnezyum, kalsiyum gibi iki ve üç değerli minerallerle birlikte kullanılmamalıdır. Bu tip mineralleri içeren ürünlerden en az 2-3 saat önce veya sonra kullanılmalıdır. Enrofloksasin, oral kullanımda özellikle Cu, Pb, Zn, Mg, Al gibi metallerle şelat oluşturma potansiyelinden dolayı bu metallerce zengin su içinde kullanılmaması önerilmektedir. Ayrıca kuzu ve buzağılarda süt emmeden 2-3 saat önce veya sonra verilmelidir. Kinolonlar ortam pH'sından etkilendiklerinden içme suyunu asitleştirici maddelerle birlikte kullanılmamalıdır. Enrofloksasinin karaciğerde metabolize edildiği bilinen diğer ilaçlarla birlikte kullanılması, söz konusu ilaçların farmakokinetiğini etkileyebilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra et için yetiştirilen buzağılar 8 gün, kuzular 10 gün ve tavuklar 12 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan tüketimine sunulan tavuklarda kullanılmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR

Tedavi dozlarında uygulandığında herhangi bir kontrendikasyonu bulunmamakla birlikte karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını bozabilir.

GENEL UYARILAR

‘Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.’
‘Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.’ ‘Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.’ ‘Ambalajı açılmış ürünleri satın almayınız.’

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN TEDBİRLER VE HEKİMLER İÇİN UYARI

Uygulama esnasında deri ve göz temasını önlemek amacıyla eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Teması halinde deri ve göz bol su ile yıkanmalıdır ve güneş ışığına maruz kalınmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (15°C - 25°C) ve güneş ışığından korunarak muhafaza edilir. Ambalajı açılmadan raf ömrü 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

100 ml'lik beyaz plastik şişeler karton kutularda, 1000 ml ve 2500 ml'lik beyaz plastik şişeler kutusuz olarak satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 07.05.2004

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİHİ VE NO: 07.05.2004 - 13/066

RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE AÇIK ADRESİ

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti.
İTOSB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

İMAL YERİ ADI VE AÇIK ADRESİ:

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti.
İTOSB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

KDV Dahil Perakende satış Fiyatı

----- TL

Üretim Tarihi/ Seri No:

Son Kullanma Tarihi:

İç Ambalaj Etiketi

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

MEDIQUINOL %10

Oral Çözelti

Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

1 ml'inde 100 mg Enrofloksasin baz içerir.

KULLANIM YERİ VE ENDİKASYONLARI

Etçi tavuklarda: CRD, Mycoplasmosis, Colicpticemia, Coryza, Fowl Cholera (tavuk kolerası), Fowl Typhoid (tavuk tifosu), Salmonellosis, Staphylococcus ve Streptococcus enfeksiyonlarında, rumen aktivitesi başlamamış kuzu ve buzağılarda; Colibacillosis, Pasteurollosis, Salmonellosis, Mycoplasmosis, duyarlı bakteriler tarafından oluşturulan solunum ve üriner sistem enfeksiyonları ile viral hastalıklar sonucu oluşan sekonder bakteriyel enfeksiyonların sağaltımında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

“Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde.”

Etçi tavuklarda uygulanacak dozu 10 mg/kg canlı ağırlık/gün olup, her 1000 kg canlı ağırlık için günde 100 ml çözelti içme suyuna ilave edilerek kullanılır. Etkinlik kaybının olmaması açısından ilaçlı suyun günlük olarak hazırlanması gerekir. İlacın karıştırılacağı suyun asit karakter taşımamasına özen gösterilmelidir. Tedavi süresi 3 gündür (Salmonellosis' te ve şiddetli enfeksiyonlarda 5 gün).

Rumen aktivitesi başlamamış kuzu ve buzağılarda ise ilaç dozu 2,5 mg/kg canlı ağırlık/gün esası ile 40 kg canlı ağırlığa 1 ml MEDIQUINOL olacak şekilde içme suyuna ilave edilerek 3-5 gün süreyle uygulamaya devam edilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra et için yetiştirilen buzağılar 8 gün, kuzular 10 gün ve tavuklar 12 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan tüketimine sunulan tavuklarda kullanılmamalıdır.

‘Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.’

‘Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.’ ‘Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.’ ‘Ambalajı açılmış ürünleri satın almayınız.’

Oda sıcaklığında (15°C - 25°C) ve güneş ışığından korunarak muhafaza edilir. Ambalajı açılmadan raf ömrü 2 yıldır.

100 ml'lik beyaz plastik şişeler karton kutularda, 1000 ml ve 2500 ml'lik beyaz renkli ve kırmızı kilit kapaklı plastik şişeler kutusuz olarak satışa sunulmuştur.

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır. (VHR)

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİHİ VE NO: 07.05.2004 - 13/066

RUHSAT SAHİBİNİN ADI/AÇIK ADRESİ

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San.Ve Tic. Ltd. Şti.

İTOSB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

İMAL YERİ ADI/ AÇIK ADRESİ:

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San.Ve Tic. Ltd. Şti.

İTOSB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

KDV Dahil Perakende satış Fiyatı

----- YTL

Üretim Tarihi/ Seri No:

Son Kullanma Tarihi:

Dış Ambalaj Etiketİ

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
MEDIQUINOL %10
Oral Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

1 ml'inde 100 mg Enrofloksasin baz içerir.

KULLANIM YERİ VE ENDİKASYONLARI

Etçi tavuklarda: CRD, Mycoplasmosis, Colicepticemia, Coryza, Fowl Cholera (tavuk kolerası), Fowl Typhoid (tavuk tifosu), Salmonellosis, Staphylococcus ve Streptococcus enfeksiyonlarında, rumen aktivitesi başlamamış kuzu ve buzağılarda; Colibacillosis, Pasteurellosis, Salmonellosis, Mycoplasmosis, duyarlı bakteriler tarafından oluşturulan solunum ve üriner sistem enfeksiyonları ile viral hastalıklar sonucu oluşan sekonder bakteriyel enfeksiyonların sağaltımında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

“Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde.”

Mediquinol %10 Oral Çözelti'nin etçi tavuklarda uygulanacak dozu 10 mg/kg canlı ağırlık/gün olup, içme suyuna ilave edilerek kullanılır. Pratik olarak her 1000 kg canlı ağırlık için günde 100 ml ilaç yeterlidir. Gerekli ilaç miktarı yeteri kadar su ile karıştırılır ve 3 gün boyunca içirilir. Salmonellosis'te veya şiddetli enfeksiyonlarda 5 güne çıkarılmalıdır. Etkinlik kaybının olmaması açısından ilaçlı suyun günlük olarak hazırlanması gerekir, ilacın karıştırılacağı suyun asit karakter taşımasına özen gösterilmelidir.

Rumen aktivitesi başlamamış kuzu ve buzağılarda ise ilaç dozu 2,5 mg/kg canlı ağırlık/gün esası ile 40 kg canlı ağırlığa 1 ml Mediquinol olacak şekilde içme suyuna ilave edilerek 3-5 gün süreyle uygulamaya devam edilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra et için yetiştirilen buzağılar 8 gün, kuzular 10 gün ve tavuklar 12 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan tüketimine sunulan tavuklarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

‘Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.’

‘Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.’ ‘Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.’ ‘Ambalajı açılmış ürünleri satın almayınız.’

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (15°C - 25°C) ve güneş ışığından korunarak muhafaza edilir. Ambalajı açılmadan raf ömrü 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

100 ml'lik beyaz plastik şişeler karton kutularda, 1000 ml ve 2500 ml'lik beyaz renkli ve kırmızı kilit kapaklı plastik şişeler kutusuz olarak satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır. (VHR)

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİHİ VE NO: 07.05.2004 - 13/066

RUHSAT SAHİBİNİN ADI/AÇIK ADRESİ

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti.
İTOSB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

İMAL YERİ ADI/ AÇIK ADRESİ:

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti.
İTOSB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

KDV Dahil Perakende satış Fiyatı

----- YTL

Üretim Tarihi/ Seri No:

Son Kullanma Tarihi: