

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında kullanılır.

PIPERVET

Oral Toz

Antihelmintik

BİLEŞİMİ

PIPERVET Oral Toz beyaz kristalize, suda kolayca çözünebilen toz olup her gramında 500 mg Piperazin diklorhidrat (270 mg Piperazin baza eşdeğer) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

PIPERVET Oral Toz etkin maddesi olan Piperazin dietilendiamid türevi antinematodal bir antihelmintiktir. Nematodların kas sinir bağlantısında kolinerjik etki ile önce hiperpolarizasyon, bunu takiben reversabl gevşek felç meydana getirir, enerjisini yitiren parazit barsak peristaltığı ile yer değiştirir, dışkı ile atılır. Dar spektrumlu bir antihelmintiktir. Piperazin barsakların ön bölümünden hızla ve tama yakın oranda emilir. 1-8 saat içinde kanda en yüksek konsantrasyona erişir. Esas olarak idrarla kısmen, kısmen de dışkı ile atılır. Kısmen metabolize olur. Kanatlılarda %70'ten fazlası ilk 24 saat içinde tamamı 3 gün içinde vücuttan atılır.

KULLANIM YERİ VE ENDİKASYONLARI

PIPERVET Oral Toz, tavuklarda yaşayan *Ascaridia galli* ve *Heterakis gallinarum* ile kedi ve köpeklerde görülen *Toxocara canis* ve *Ancylostoma duodenale* türlerinin mücadelesinde tedavi amaçlı olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

'Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde'

Hayvan Türü	Doz (PIPERVET Toz)	Tedavi Süresi
Tavuklar		
4-8 haftalıklar	0.1-0.2 g/civciv/gün	2 gün
8-12 haftalıklar	0.2-0.6 g/piliç/gün	2 gün
12-20 haftalıklar	0.4-0.6 g/piliç/gün	2 gün
20 haftalıktan büyükler	0.5-1 g/tavuk/gün	2 gün
Kedi ve köpekler	100-150 mg/kg CA/gün	2 gün

PIPERVET Oral Toz'un pratik dozları; 4-8 haftalık civciv için günlük 0.1 - 0.2 g hesabıyla 2 gün, 8-12 haftalık her piliç için günlük 0.2 - 0.6 g hesabıyla 2 gün, 12 - 20 haftalık her piliç için günlük 0.4 - 0.6 g hesabıyla 2 gün, 20 haftalıktan büyük her piliç için günlük 0.5 - 1 g hesabıyla 2 gün uygulanır. Kedi ve köpekler için günlük 100 - 150 mg/kg CA hesaplanır.

İlaç, hayvanların içme sularına katılarak 2 gün boyunca uygulanır. Ortalama 7 veya 14 gün sonra uygulama tekrarlanır. Kullanılacak ilaçlı su günlük olarak hazırlanmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

İlaçlı içme suyunun kısa sürede ve tam olarak tüketilmesini sağlamak için, ilaçlı içme suyu verilmeden önce hayvanların 2 - 3 saat süreyle susuz bırakılması önerilir. Hazırlanan ilaçlı su tümüyle bitene kadar (en fazla 48 saat) hayvanların önünde tutulmalı ve bu sürede başka su verilmemelidir. Nematodlar barsakta ergin halde bulunur, burada yumurtlar. **PIPERVET Oral Toz**, kokusuz ve lezzetsiz olduğundan suyun tadını bozmaz.

Gebelikte ve Doğum Sonrasında Kullanımı: Gebelikte ilacın güvenli kullanımı konusunun tam aydınlanmaması nedeniyle gebelikte kullanılmaması tavsiye edilir. Emziren kedi ve köpeklerde kullanılmaması tavsiye edilir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Yüksek sağaltım dozları özellikle köpek ve kedilerde nörotoksik etki yaparak kusma, ishal ve koordinasyon bozukluğuna neden olabilir. Çok yoğun askarit invazyonlarında ilacın etkisi ile felç olan askaritler, barsaklardan atılmaları sırasında yumak haline gelerek barsak lumenini tıkayabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Piperazin, fenotiyazin ile beraber kullanıldığında kramplara ve aşırı duyarlılığa neden olabilir.

Levamisol, pirantel ve morantel gibi kolinerjik antihelmintiklerle bir arada kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Uzun süreli ve aşırı yüksek dozlarda kullanılması durumunda bulantı, kusma, ishal, koordinasyon bozukluğu görülebilir. Bu durumda ilaçla tedaviye son verilir ve bol sıvı uygulamasıyla böbreklerden atılım sağlanır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tavuk eti ve yumurta için ilaç kalıntı arınma süresi sıfır (0) gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumlarında kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

“Kullanılmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.” “Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.”

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Piperazine duyarlılığı olan kişilerin ağız, deri ve solunum yoluyla ilaca maruz kalmaktan sakınması gerekir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (15-30 °C), kuru yerde ve güneş ışığından korunarak muhafaza edilir. Raf ömrü 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde; 100 g polietilen poşetlerde, 500 g ve 1 kg polietilen poşetlerde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle, veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 17.02.2016

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NO: 05.07.1985-005/0488

RUHSAT SAHİBİNİN ADI/AÇIK ADRESİ

MEDICAVET Tarım Hayvancılık İlaç ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
İTOSB Eski Ankara Asfaltı 12. Cadde No:1 Tepeören-TUZLA/İSTANBUL

İMAL YERİ:

MEDICAVET Tarım Hayvancılık İlaç ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
İTOSB Eski Ankara Asfaltı 12. Cadde No:1 Tepeören-TUZLA/İSTANBUL

KDV Dahil Perakende Satış Fiyatı:

İmal Tarihi ve Seri No:

Son Kullanma Tarihi: