

Sadece Hayvan Saęlıęında Kullanılır
MEDICAMOX
Oral özelti Tozu
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŐİMİ

MEDICAMOX Oral özelti Tozu, beyaz-kirli beyaz renkli ince partiküllerden oluşan toz olup, 1gr'ında 564,3 mg (500 mg amoksisiline eşdeęer) Amoksisilintrihidrat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

MEDICAMOX Oral özelti Tozu, yarı-sentetik ve geniş antibakteriyel spektrumlu bir penisilin türevidir. Amoksisilin bakteriyel hücre duvarında bulunan spesifik proteinlere bağlanarak bakteriyel hücre duvarı sentezini önler ve bakteriyel parçalanmasına yol açar, böylece duyarlı patojen bakterilerde bakterisidal etki şekillenir. Amoksisilin hem gram pozitif hem de gram negatif bakterilere etkinlik gösterir.

Duyarlı bakteriler: Beta hemolitik *Streptococcus sp.*'leri de içeren çoęu gram pozitif bakteriler (*Strep. agalactiae*, *S. canis*, *S. zooepidemicus*, *S. dysgalactiae*, *S. suis*, *S. uberis*, *Bacillus anthracis*, *Actinomyces sp.*, çoęu *Corynebacter sp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, çoęu *Listeria monocytogenes*), bazı anaeroblar (*Clostridium sp.*, çoęu *Fusobacterium sp.*, bazı *Bacteroides sp.*), bazı gram negatif aeroblar (*Haemophilus somnus*), *Borrelia sp.*, *Leptospira sp.*, *Actinobacillus sp.*, *Haemophilus sp.*, *Moraxella sp.*, *Pasteurella sp.*

Orta dereceli duyarlılık gösteren bakteriler: Kazanılmış baęışıklık nedeniyle deęişmekle birlikte Őu bakteriler orta derecede duyarlıdır; *Actinobacillus sp.*, *Borrelia sp.*, *Haemophilus sp.*, *Leptospira sp.*, *Moraxella sp.*, *Pasteurella sp.*, *Proteus sp.*, *Taylorella equigenitalis*, *Serpulina sp.*, *Campylobacter sp.*, *Enterococci*, *Rhodococcus equi*, *Enterobacteriaceae*'da direnç geliřimi yaygındır.

Dirençli bakteriler: *Bacteroides fragilis*, *Bordetella bronchiseptica*, *Citrobacter sp.*, *Enterobacter sp.*, *Klebsiella sp.*, dięer *Proteus sp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Serratia sp.*, *Yersinia enterocolitica*.

Hayvanlara aęız yoluyla verildięinde sindirim kanalından kolayca ve tama yakın oranlarda emilerek yarım saatte etkili kan yoęunluęuna ulařır ve tüm vücuda geniş ölçekte daęılır. Özellikle solunum yolları, karacięer, böbrek ve üriner sistemde yoęunlaşır. Etkili yoęunluklarda yumuřak dokular, deri ve mukozalara da geçer. Amoksisilin, bařlıca tübüler salgılama mekanizmasıyla böbrekler aracılıęıyla vücuttan atılır. Bir dozla verilen ilacın küçük bir kısmı penisiloid aside hidrolize olarak etkisiz metabolitleri halinde ve büyük bölümü de hiçbir deęişikliğe uğramadan atılır.

KULLANIM YERİ VE ENDİKASYONLARI

MEDICAMOX Oral özelti Tozu, etçi tavuk ve hindilerde görülen Colibacillosis, Pullorum, Tifo, Paratifo, hindilerin hava kesesi yangısı, Enfeksiyöz Koriza, Listeriosis, Clostridium enfeksiyonları ile viral ve Mycoplasma kökenli (CRD ve CCRD) hastalıklara karřan ikincil bakteriyel enfeksiyonların saęaltımında kullanılır.

KULLANIM ŐEKLİ VE DOZU

'Veteriner hekim tarafından başka Őekilde tavsiye edilmedięi takdirde'

Amoksisilin esasına göre uygulanacak ila dozunu 20 mg/kg canlı aęırlık/gün olup; uygulama ime suyu yoluyla, hastalığın Őiddetine baęlı olarak 3-5 gün süreyle uygulanır. Günlük olarak alınması gereken doz, 2-3 saat iinde tüketilecek ime suyu ierisinde çözdürülerek verilebilir.

Etçi tavuk ve hindilerde toplu saęaltım iin, toplam canlı aęırlık esasına göre hesaplanacak günlük ila miktarı;

MEDICAMOX Oral özelti Tozu = Kanatlı sayısı x Ortalama canlı aęırlık x 40/1000

eřitlięinden hesaplanır veya daha pratik bir yaklařım Őekli olarak ařaęıdaki doz tablosundan yararlanılır.

Ortalama canlı aęırlık (kg)	10.000 adet hayvana verilecek MEDICAMOX Oral özelti Tozu miktarı (g)
0,25	100
0,50	200
1,0	400
1,5	600
2,0	800

Günlük olarak hesaplanan MEDICAMOX Oral Çözelti Toz miktarı, her 50 g ilaca 300 ml su denk gelecek şekilde su katılarak homojen bir ön süspansiyon elde edilene değin karıştırıldıktan sonra, ana su tankına aktarılır. Su içerisinde ve gün boyunca sürekli ilaç verilmesi istendiğinde su tankının 2 – 3 saatlik aralıklarla karıştırılması gerekir. Ancak 12 saat içerisinde tüketilmeyen ilaçlı sular tekrar kullanılmaz. Daha güvenli bir uygulama seçeneği olarak, gerekli görüldüğünde kanatlı sürüsü için hesaplanan günlük ilaç dozu kontrollü su tüketimi ilkesine göre 2 –3 saatlik süreçte de içirilebilir. Bunun için uygulamadan 2 saat önce (yaz aylarında daha kısa tutulabilir) hayvanların içme suyu kapatılır ve hazırlanan ilaçlı ön karışım 2 –3 saatte bitirilebilecek kadar su bulunan ana su tankına aktarılıp iyice karıştırıldıktan sonra, içirilir.İlaçlı suyun verilmesi aşamasında hayvanlara temiz su verilmemelidir. İlaçlı su uygulaması tamamlandıktan sonra normal içme suyuna dönülebilir. Tavsiye edilen doz ve süre aşılmamalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLERİ

Amoksisilin, beta-laktam antibiyotiklere duyarlı veya alerjik olan hayvanlarda değişik alerjik reaksiyonların gelişmesine veya ölüme kadar gidebilen ciddi bozukluklara sebep olabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Beta laktam grubu antibakteriyel ilaçlar; makrolidler, tetrasiklinler ve fenikoller ile birlikte kullanılmamalıdır. Amoksisilin, aminoglikozidlerin bakteri hücrelerine geçişini kolaylaştırarak sinerjistik bir etki oluşturur, ayrıca amidazlar ve penisilinazlar esasına dayalı enzimlerin bulunduğu ortamlarda inaktive olur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar ve hindiler 7 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen hindi ve tavuklara uygulanamaz.

KONTRENDİKASYONLAR

Penisilinlere alerjisi olan hayvanlarda kontrendikedir.

GENEL UYARILAR

‘Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.’

‘Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.’ ‘Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.’ ‘Ambalajı açılmış ürünleri satın almayınız.’

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN TEDBİRLER VE HEKİMLER İÇİN UYARI

Penisilinlere duyarlılığı olan kişilerin ağız, deri veya inhalasyon yoluyla ilaca maruz kalmaktan sakınması gerekir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

25 °C'nin altında serin ve rutubetsiz bir ortamda muhafaza edilmelidir. Üretiminden itibaren raf ömrü 24 aydır.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARI

Tavşan, kobay, hamster gibi küçük kemirgenlerde, kaz, ördek gibi perde ayaklılarda ve ergin atlarda kontrendikedir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

20, 100gr'lık beyaz plastik şişelerde karton kutu içinde, 1000 gr'lık beyaz plastik şişelerde kutusuz, 100 gr'lık alüminyum folyolar 10'ar, 250 gr'lık alüminyum folyolar 4'er adetlik karton kutularda, 1 kg'lık alüminyum folyolar kutusuz olarak sunulmaktadır

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NUMARASI: 05.08.2004 – 13/083

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 27.10.2004

RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE AÇIK ADRESİ

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San.Ve Tic. Ltd. Şti.

İTOSB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

İMAL YERİ ADI /AÇIK ADRESİ:

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San.Ve Tic. Ltd. Şti.
İTOSB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

İmal Tarihi ve Seri No:

Son Kullanım Tarihi:

KDV Dahil Perakende Satış Fiyatı:

100 ve 250 gramlık folyolar için dış etiket

100 gramlık şişeler için iç etiket

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
MEDICAMOX
Oral Çözelti Tozu
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

1gr'ında 564,3 mg Amoksisilintrihidrat (500 mg amoksisiline eşdeğer) içerir.

KULLANIM YERİ VE ENDİKASYONLAR

MEDICAMOX Oral Çözelti Tozu, etçi tavuk ve hindilerde görülen Colibacillosis, Pullorum, Tifo, Paratifo, hindilerin hava kesesi yangısı, Enfeksiyöz Koriza, Listeriosis, Clostridiumenfeksiyonları ile viral ve *Mycoplasma* kökenli (CRD ve CCRD) hastalıklara karışan ikincil bakteriyel enfeksiyonların sağaltımında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

'Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde'

Amoksisilin esasına göre uygulanacak ilaç dozu 20 mg/kg canlı ağırlık/gün olup; uygulama içme suyu yoluyla, hastalığın şiddetine bağlı olarak 3-5 gün süreyle uygulanır. Günlük olarak alınması gereken doz, 2-3 saat içinde tüketilecek içme suyu içerisinde çözdürülerek verilebilir.

Etçi tavuk ve hindilerde toplu sağaltım için, toplam canlı ağırlık esasına göre hesaplanacak günlük ilaç miktarı;

MEDICAMOX Oral Çözelti Tozu = Kanatlı sayısı x Ortalama canlı ağırlık x 40/1000

eşitliğinden hesaplanır veya daha pratik bir yaklaşım şekli olarak aşağıdaki doz tablosundan yararlanılır.

Ortalama canlı ağırlık (kg)	10.000 adet hayvana verilecek MEDICAMOX Oral Çözelti Tozu miktarı (g)
0,25	100
0,50	200
1,0	400
1,5	600
2,0	800

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar ve hindiler 7 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen hindi ve tavuklara uygulanamaz.

GENEL UYARILAR

Kullanılmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

25 °C'nin altında serin ve rutubetsiz bir ortamda muhafaza edilmelidir. Üretiminden itibaren raf ömrü 24 aydır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

MEDICAMOX Oral Çözelti Tozu, 20, 100gr'lık beyaz plastik şişelerde karton kutu içinde, 1000 gr'lık beyaz plastik şişelerde kutusuz, 100 gr'lık alüminyum folyolar 10'ar, 250 gr'lık alüminyum folyolar 4'er adetlik karton kutularda, 1 kg'lık alüminyum folyolar kutusuz olarak sunulmaktadır

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NUMARASI: 05.08.2004 – 13/083

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 27.10.2004

RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE AÇIK ADRESİ

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti.
İTO SB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

İMAL YERİ ADI VE AÇIK ADRESİ:

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti.
İTO SB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

İmal Tarihi ve Seri No:**Son Kullanım Tarihi:****KDV Dahil Perakende Satış Fiyatı:**