

Sadece Hayvan Saęlıęında Kullanılır

MEDIFLUM

Oral Çözelti Tozu

Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

MEDIFLUM, her gramında 500 mg Flumekuın içeren beyaz, homojen tozdur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

MEDIFLUM Oral Çözelti Tozunun etken maddesini oluşturan Flumekuın, fluorokinon türevi sentetik bir antibakteriyeldir. Duyarlı bakterilerde hızla gelişen bakterisid etki meydana getirir. Antibakteriyel etkisi DNA-jiraz (topoizomeraz II) enzimini inhibe etmek suretiyle gerçekleşir. Başlıca duyarlı bakteriler; *E.coli*, *Salmonella sp.*, *Enterobactersp.*, *Serratiasp.*, *Proteus sp.*, *Klebsialla sp.*, *Shigella sp.*, *Yersinia sp.*, *Moraxella sp.*, *Acinobacter sp.*, *Actinobacillus sp.*, *Pasteurella sp.*, *Leptospira sp.*, *Campylobacter sp.*, *Citrobacter sp.*, *Haemophilus sp.*, *Ehrlichia sp.*, *Coxiellabrunetti*, metisiline ve gentamisine dirençli olanlar da dahil *Staphylococcus sp.*, penisiline dirençli olanlar da dahil *N. Gonorrhoeae*, *N. Meningditis*, *Corynebacterium sp.*, *Chlamydia sp.*, *V. Cholerae*, *Mycoplasmasp.*'dir. *Strep. suis*, *Strep. agalactia*, *Strep. dysgalactia*, *Strep. zooepidemicus*, *R. equi*, *Mycobacterium sp.* orta derecede duyarlılık gösterir. Anaerobik kokların çoęu *Clostridium sp.*, *Bacteroides sp.* ve *Ps. maltophilakinolonlara* genellikle az duyarlı veya dirençlidir. Oral uygulamadan sonra sindirim sisteminden oldukça iyi emilir. Dokularda iyi bir dağılım gösterirken dokuda retensiyonu gözlenmez. 5 saat civarında plazma yarı ömür gösterir. Karaciğerde hidrolizinden sonra glukoronize edilir. Flumekuın ve metabolitleri safra ve idrarla atılır.

KULLANIM YERİ VE ENDİKASYONLARI

MEDIFLUM Oral Çözelti Tozu, etçi tavuk ve hindilerde; Kolibasiloz (*E. Coli* enfeksiyonları), Pasteurellosis (Tavuk kolerası), Salmonellozis ve flumekuine duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum ve sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

"Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmedięi takdirde"

Tedavi dozu: Farmakolojik dozu: 10 mg/kg canlı aęırlık/gün' dür.

Pratik doz: Her 50 kg canlı aęırlık için günde 1 gram toz içme suyuna katılarak kullanılır. İlacın hazırlanışında ilacın önce belli bir miktar su içinde eritildikten sonra gerekli olan toplam çözeltisi hazırlanmalı ve oral yolla uygulanmalıdır. İlaçlı su taze olarak günlük hazırlanır. Tedaviye 3-5 gün devam edilmelidir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Kinolonlar bazen idrar yollarında kristallenmeye yol açabilir. Bu nedenle bu ilaçlar verilirken su kısıtlaması yapılmamalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Florokinolonlar ile aminoglikozidler, beta-laktam ilaçlar ve sülfonamidler arasında aynı yönde (sinerjistik); eritromisin, polimiksin, nitrofurantoin ve rifampin arasında aksi yönde (antagonist) etkileşimler vardır. Şelat oluşturmaları nedeniyle alüminyum, demir, magnezyum, kalsiyum gibi iki ve üç değerli minerallerle birlikte kullanılmamalıdır. Bu tip mineralleri içeren ürünlerden en az 2-3 saat önce veya sonra kullanılmalıdır. Oral kullanımda özellikle Cu, Pb, Zn, Mg, Al gibi metallerle şelat oluşturma potansiyelinden dolayı bu metallerle zengin su içinde kullanılmaması önerilmektedir. Kinolonlar ortam pH'sından etkilendiklerinden içme suyunu asitleştirici maddelerle birlikte kullanılmamalıdır. Enrofloksasinin karaciğerde metabolize edildięi bilinen dięer ilaçlarla birlikte kullanılması, söz konusu ilaçların farmakokinetiğini etkileyebilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Aşırı doz halinde sindirim sisteminde motilite bozukluęu ve daire gözlenebilir. Uygulamanın kesilmesinden sonra durum normale döner. Uzun süreli ve aşırı doz halinde eklem kıkırdaklarında deformasyon gözlenebilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben 2 gün geçmeden etçi tavuklar ile hindiler kesime gönderilmemelidir. Yumurtaları insan tüketiminde kullanılan tavuk ve hindilerde kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLAR

Belirtilen dozlarda kullanımı halinde etçi tavuk ve hindilerde kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR

‘Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.’
‘Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.’ ‘Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.’ ‘Ambalajı açılmış ürünleri satın almayınız.’

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN TEDBİRLER VE HEKİMLER İÇİN UYARI

Uygulama esnasında deri ve göz temasını önlemek amacıyla eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Teması halinde deri ve göz bol su ile yıkanmalıdır ve güneş ışığına maruz kalınmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (15°C - 30°C) ve güneş ışığından ve nemden korunarak muhafaza edilir. Ambalajı açılmadan raf ömrü 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

20 g’lık plastik kavanozlarda kutulu olarak ve 100 g, 250 g, 1 kg ve 2.5 kg’lık plastik ambalajlarda kutusuz olarak satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile, veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 28.03.2012

GIDA TARIM HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİNİ TARİHİ VE NUMARASI: 23.03.2012-25/075

PAZARLAMA İZİNİ SAHİBİ ADI VE ADRESİ

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San.Ve Tic. Ltd. Şti.
İTO SB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

İMAL YERİ ADI VE AÇIK ADRESİ:

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San.Ve Tic. Ltd. Şti.
İTO SB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

İÇ ETİKET (20 gr):

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
MEDIFLUM
Oral Çözelti Tozu
Sistemik Antibakteriyel

MEDIFLUM, her gramında 500 mg Flumekuini içeren beyaz, homojen tozdur.

GENEL UYARILAR

‘Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.’ ‘Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.’

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 28.03.2012

GIDA TARIM HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİNİ TARİHİ VE NUMARASI: 23.03.2012-25/075

PAZARLAMA İZİNİ SAHİBİ/ ADRESİ:

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San.Ve Tic. Ltd. Şti.
İTO SB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

İmal Tarihi ve Seri No:

Son Kullanma Tarihi:

DIŐ ETİKET:(20 g, 100 g, 250 g, 1 kg ve 2.5 k için)

Sadece Hayvan Saęlıęında Kullanılır

MEDIFLUM

Oral Çözelti Tozu

Sistemik Antibakteriyel

BİLEŐİMİ

MEDIFLUM, her gramında 500 mg Flumequin ieren beyaz, homojen tozdur.

KULLANIM YERİ VE ENDİKASYONLARI

MEDIFLUM Oral Çözelti Tozu, ei tavuk ve hindilerde; Kolibasiloz (E. coli enfeksiyonları), Pasteurellosis (Tavuk kolerası), Salmonellozis ve flumequine duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum ve sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŐEKLİ VE DOZU

"Veteriner hekim tarafından baŐka Őekilde tavsiye edilmedięi takdirde"

Tedavi dozu:Farmakolojik doz: 10 mg/kg canlı aęırlık/gün' dır.

Pratik doz: Her 50 kg canlı aęırlık için günde 1 gram toz ime suyuna katılarak kullanılır. Gerekli olan miktar yeteri kadar su ile karıŐtırılarak oral yolla uygulanır. İlalı su taze olarak gınlük hazırlanır. Tedaviye 3-5 gın devam edilmelidir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İla kalıntı arınma sđresi (i.k.a.s.); Tedavi sđresince ve son ila kullanımını takiben 2 gın gemeden ei tavuklar ile hindiler kesime gınderilmemelidir. Yumurtaları insan tđkretiminde kullanılan tavuk ve hindilerde kullanılmaz.

GENEL UYARILAR

'Kullanmadan nce ve beklenmeyen bir etki gırdđęünde veteriner hekime danıŐınız.'

'ocukların ulaŐamayacaęı yerlerde bulundurunuz.' 'Kullanmadan nce prospektđsđ okuyunuz.' 'Ambalajı aılmıŐ őrđnleri satın almayınız.'

MUHAFAZA ŐARTLARI VE RAF MRĐ

Oda sıcaklıęında (15°C - 30°C) ve gđneŐ iŐıęından ve nemden korunarak muhafaza edilir. Ambalajı aılmadan raf mrđ 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŐEKLİ

20 g'lık plastik kavanozlarda kutulu olarak ve 100 g, 250 g, 1 kg ve 2.5 kg'lık plastik ambalajlarda kutusuz olarak satıŐa sunulmuŐtur.

SATIŐ YERİ VE ŐARTLARI

Veteriner hekim reetesi ile, veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır. (VHR)

GIDA TARIM HAYVANCILIK BAKANLIęI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NUMARASI: 23.03.2012-25/075

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ/ ADRESİ:

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İla Ve Kimya San. Ve Tic. Ltd. Őti.

İTO SB, Eski Asfaltı őreri, 12. Cadde No:1 34959, Tepe ren, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

İMAL YERİ ADI /AIK ADRESİ:

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İla Ve Kimya San. Ve Tic. Ltd. Őti.

İTO SB, Eski Asfaltı 12. Cadde No:1 34959, Tepe ren, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

KDV Dahil Perakende SatıŐ Fiyatı:

İmal Tarihi ve Seri No:

Son Kullanma Tarihi: