

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
PARAMINOD
Oral Çözelti Tozu
Veteriner Sistemik Antibakteriyel - Antiprotozoal

BİLEŞİMİ

PARAMINOD, beyaz homojen toz olup, her gramında 70 mg Paromomisin ya da Aminosidin baza eşdeğer 100 mg Paromomisin Sülfat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Paromomisin (Aminosidin), aminoglikozid grubundan bir antibiyotiktir. Pek çok Gram (-) bakteri ile bazı Gram (+) bakteri ve protozalara karşı etkilidir. Etkisini ribozomlara irreversible bağlanarak, protein sentezini aksatmak yoluyla gösterir. Etki spektrumuna Salmonella typhimurium ve S.pullorum, E. coli, Streptococcus agalactiae, S. equisimilis, S.hyicus, Diplococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes, Staphylococcus sp., Brucella abortus ve B. melitensis ile daha yüksek konsantrasyonlarda Mycobacterium tuberculosis gibi bakteriler ve Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica, Trichomonas sp., Giardia intestinalis, Leishmania sp. gibi protozoalar girer.

Oral yolla alındıktan sonra kısa sürede etkisini gösteren aminosidin, gastro-intestinal sistemde kalmakta ve sindirim sisteminden çok az miktarda emilmektedir. Dolayısıyla bu noktadaki patojenlere karşı yüksek seviyede etki sağlar.

Aminosidin, özellikle Salmonella, E. coli ve Cryptosporidium tarafından oluşturulan enteritislerin tedavisinde etkilidir.

Diğer antibiyotiklerle çapraz direnç gözlenmez.

KULLANIM YERİ ve ENDİKASYONLARI

PARAMINOD buzağılarda; E.coli, Salmonella ve Cryptosporidium parvum tarafından oluşturulan enteritislerin tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU

“Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde.”

Farmakolojik Dozu:

Kolibasilloz ve Salmonellozis için 25-50 mg Aminosidin sülfat/ kg canlı ağırlık, Kriptosporidiozis için 50-100 mg Aminosidin sülfat/kg canlı ağırlıktır.

Pratik Dozu:

Buzağılarda	Dozu (100 kg canlı ağırlık/gün)	Kullanım Süresi
Kolibasilloz ve Salmonellozis	25-50 g PARAMINOD	3 - 5 Gün
Kriptosporidiozis	50-100 g PARAMINOD	5 Gün

İçme suyuna veya süte katılarak oral yolla kullanılır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Beta-laktam antibiyotikler ve basitrasin gibi hücre duvarına etkili antibiyotiklerle sinerjik etkileşim gösterir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER ve ANTİDOT

Zehirlenme belirtileri görülmez.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER ve HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Rumen faaliyetleri başlamış ruminantlarda kullanılması tavsiye edilmez.

İSTENMEYEN ETKİLER

Uzun süre kullanıldığında sindirim kanalı mikroflorasını bozabilir. Aminoglikozitlerin ışıtm ve denge organları üzerinde olumsuz etkileri vardır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 30 gün geçmeden sığırlar, kesime gönderilmemelidir. Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaması önerilir.

KONTRENDİKASYONLAR

Belirtilen doz ve aralıklarda kullanıldığında bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR

‘Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.’ ‘Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.’

MUHAFAZA ŞARTLARI ve RAF ÖMRÜ

Orijinal paketinde, oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü iki yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

20 g’lık beyaz plastik şişelerde kutulu olarak, 100 g, 500 g, 1 kg ve 2.5 kg’lık beyaz plastik kavanozlarda kutusuz olarak satışa sunulmuştur

SATIŞ YERİ ve ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 28.03.2012

GIDA TARIM HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ ve NUMARASI: 23.032012-25/076

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ/ ADRESİ

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San.Ve Tic. Ltd. Şti.

İTOSB, Eski Asfaltı Üzeri, 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE

İMAL YERİ/ ADRESİ

Medicavet Tarım, Hayvancılık, İlaç Ve Kimya San.Ve Tic. Ltd. Şti.

İTOSB, Eski Asfaltı Üzeri, 12. Cadde No:1 34959, Tepeören, Tuzla, İSTANBUL/TÜRKİYE